コロマイト水和剤

<table>
<tr><th>作物名</th><th>適用病害虫名</th><th>希釈倍数</th><th>使用液量</th><th>使用時期</th><th>本剤の
使用回数</th><th>使用方法</th><th>ミルベメクチンを含む
農薬の総使用回数</th></tr>
<tr><td rowspan="2">かんきつ</td><td>ハダニ類
チャノホコリダニ
ミカンキジラミ</td><td>2000倍</td><td rowspan="2">500～
700L/10a</td><td rowspan="2">収穫7日前まで</td><td rowspan="2">2回以内</td><td rowspan="15">散布</td><td rowspan="2">2回以内</td></tr>
<tr><td>ミカンサビダニ</td><td>2000～
3000倍</td></tr>
<tr><td>りんご</td><td>ハダニ類</td><td rowspan="14">2000倍</td><td rowspan="2">400～
700L/10a</td><td rowspan="3">収穫前日まで</td><td rowspan="3">1回</td><td rowspan="2">1回</td></tr>
<tr><td>なし</td><td>ハダニ類
ニセナシサビダニ</td></tr>
<tr><td>いちじく</td><td rowspan="4">ハダニ類</td><td rowspan="2">200～
700L/10a</td></tr>
<tr><td>ぶどう</td><td rowspan="2">収穫7日前まで</td><td rowspan="4">2回以内</td><td rowspan="4">2回以内</td></tr>
<tr><td>すいか</td><td rowspan="6">100～
300L/10a</td></tr>
<tr><td>きゅうり
メロン
なす</td><td rowspan="3">収穫前日まで</td></tr>
<tr><td>いちご</td><td>ハダニ類
シクラメンホコリダニ</td></tr>
<tr><td>ふき</td><td rowspan="3">ハダニ類</td><td rowspan="2">1回</td><td rowspan="2">1回</td></tr>
<tr><td>食用ぎく</td></tr>
<tr><td>きく</td><td rowspan="4">発生初期</td><td rowspan="4">2回以内</td><td rowspan="4">2回以内</td></tr>
<tr><td>げっきつ</td><td>ミカンキジラミ</td></tr>
<tr><td>ばら</td><td rowspan="2">ハダニ類</td><td>100～
200L/10a</td></tr>
<tr><td>りんどう</td><td>100～
150L/10a</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>