

アフエットフロアブル

| 作物名 | 適用病害名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | ペンチオピラドを含む農薬の総使用回数 | | | | | |
|--|---|------------|---|---------------------|---------|------|-------------------------------------|---------|------|----|------|------|
| 小粒核果類 もも ネクタリン | 灰星病 黒星病 | 2000倍 | 200～ 700L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 | | | | | |
| おうとう | 灰星病 幼果菌核病 | | | | | | | | | | | |
| なし | 黒星病 赤星病 うどんこ病 | | | | | | | | | | | |
| りんご | 黒星病 赤星病 うどんこ病 斑点落葉病 褐斑病 モリニア病 黒点病 すす点病 すす斑病 | | | | | | | | | | | |
| かんきつ | 灰色かび病 そうか病 | | | | | | | | | | | |
| かき | 落葉病 | | | | | | | | | | | |
| ぶどう | 灰色かび病 晩腐病 黒とう病 うどんこ病 褐斑病 さび病 | | | | | | | | | | | |
| キャベツ | 菌核病 株腐病 根朽病 | | | | | | | | | | | |
| はくさい | 黒斑病 白斑病 菌核病 尻腐病 | | | | | | | | | | | |
| ブロッコリー | 菌核病 黒すす病 根朽病 | | | | | | | | | | | |
| カリフラワー つるな | 菌核病 | | | | | | | | | | | |
| にら | 白斑葉枯病 さび病 白絹病 | | | | | | | 収穫7日前まで | 1回 | 散布 | 1回 | |
| にら(花茎) | 白絹病 | | | | | | | 収穫前日まで | 2回以内 | | 3回以内 | 2回以内 |
| しそ | 灰色かび病 斑点病 | | | | | | | 収穫3日前まで | | | | |
| しそ(花穂) | | 収穫前日まで | | | | | | | | | | |
| セルリー | 斑点病 菌核病 | 収穫7日前まで | 4回以内 | 4回以内 | | | | | | | | |
| しょうが | 白星病 | | | | | | | | | | | |
| にんじん | 黒葉枯病 | 2000～4000倍 | 2000～4000倍 | 2000倍 | 3回以内 | | | | | | | |
| アスパラガス | 茎枯病 褐斑病 斑点病 | | | | | | | | | | | |
| きゅうり | 灰色かび病 菌核病 うどんこ病 | 2000～4000倍 | 2000～4000倍 | 2000倍 | 3回以内 | | | | | | | |
| メロン | つる枯病 うどんこ病 | | | | | | | | | | | |
| すいか | 菌核病 つる枯病 うどんこ病 | 2000倍 | 2000～4000倍 | 2000倍 | 3回以内 | | | | | | | |
| かぼちゃ | うどんこ病 つる枯病 | | | | | | | | | | | |
| ズッキーニ にがうり | うどんこ病 | 2000～4000倍 | 2000～4000倍 | 2000倍 | 3回以内 | | | | | | | |
| ししとう | 灰色かび病 うどんこ病 黒枯病 斑点病 | | | | | | | | | | | |
| いちご | 灰色かび病 うどんこ病 輪班病 | 2000～4000倍 | 2000～4000倍 | 2000倍 | 3回以内 | | | | | | | |
| オクラ | 灰色かび病 うどんこ病 | | | | | | | | | | | |
| トマト | 灰色かび病 菌核病 葉かび病 すすかび病 | 2000～4000倍 | 2000～4000倍 | 2000倍 | 3回以内 | | | | | | | |
| ミニトマト | うどんこ病 | | | | | | | | | | | |
| ピーマン | 灰色かび病 斑点病 | 2000～4000倍 | 2000～4000倍 | 2000倍 | 3回以内 | | | | | | | |
| | 白絹病 | | | | | | | | | | | |
| なす | 灰色かび病 菌核病 すすかび病 うどんこ病 褐色斑点病 褐色円星病 | 2000倍 | 100～ 300L/10a | 生育期 但し、 収穫14日前まで | 1回 | 株元灌注 | 4回以内 (株元灌注は2回 以内、散布は2回 以内) | | | | | |
| ねぎ | 白絹病 黒腐菌核病 | 1000～2000倍 | 1L/㎡ | 生育期 但し、 収穫14日前まで | 2回以内 | 株元灌注 | 4回以内 (株元灌注は2回 以内、散布は2回 以内) | | | | | |
| | さび病 黒斑病 小菌核腐敗病 白絹病 葉枯病 | 2000倍 | 100～ 300L/10a | 収穫前日まで | 4回以内 | 散布 | 4回以内 | | | | | |
| たまねぎ | 灰色かび病 灰色腐敗病 小菌核病 | | | | | | | | | | | |
| レタス 非結球レタス | すそ枯病 灰色かび病 菌核病 白絹病 | 2000倍 | 100～ 300L/10a | 収穫3日前まで | 2回以内 | 散布 | 3回以内 | | | | | |
| パセリ | うどんこ病 | | | | | | | | | | | |
| 食用ぎく | 灰色かび病 うどんこ病 白さび病 | 2000倍 | 100～ 300L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 2回以内 | | | | | |
| 豆類(未成熟、ただし、 えだまめを除く) 豆類(種実、た だし、らっかせいを 除く) | 灰色かび病 菌核病 さび病 | | | | | | | | | | | |
| だいず えだまめ | 灰色かび病 菌核病 さび病 うどんこ病 | 2000倍 | 100～ 300L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 | | | | | |
| らっかせい | 白絹病 灰色かび病 菌核病 さび病 | | | | | | | | | | | |
| 小麦 | 赤かび病 | 200～400倍 | 60～ 150L/10a | 収穫14日前まで | 1回 | 苗床灌注 | 4回以内(苗床灌 注は1回以内、散 布は3回以内) | | | | | |
| てんさい | 根腐病 | | | | | | | | | | | |
| | 葉腐病 | 2000倍 | 100～ 300L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 4回以内(苗床灌 注は1回以内、散 布は3回以内) | | | | | |
| とうき | 苗立枯病 | 500～1000倍 | セル成形育苗ト レイ1箱または ペーパーポット1 冊(30x60cm・ 使用土壌1.5 ～4.0L)当り 0.2L | 育苗期 | 5回以内 | 灌注 | 5回以内 | | | | | |
| 花き類・観葉植物 (きく、ゆり、チュー リップ、りんどうを 除く) | 灰色かび病 うどんこ病 | 2000倍 | 100～ 300L/10a | 発病初期 | 3回以内 | 散布 | 3回以内 | | | | | |
| チューリップ | 灰色かび病 うどんこ病 褐色斑点病 | | | | | | | | | | | |
| りんどう | 灰色かび病 うどんこ病 花腐菌核病 黒斑病 | | | | | | | | | | | |
| きく | 灰色かび病 うどんこ病 白さび病 | | | | | | | | | | | |
| ゆり | 灰色かび病 うどんこ病 葉枯病 | | | | | | | | | | | |