

アフェットフロアブル

作物名	適用病害名	希釈倍数(倍)	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ペンテオピラドを含む農薬の総使用回数						
小粒核果類 もも ネクタリン	灰星病 黒星病	2000	200~ 700L/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内						
おうとう	灰星病 幼果菌核病												
なし	黒星病 赤星病 うどんこ病												
りんご	黒星病 赤星病 うどんこ病 斑点落葉病 褐斑病 モリニア病 黒点病 すす点病 すす斑病												
かんきつ	灰色かび病 そうか病												
かき	落葉病												
ぶどう	灰色かび病 晩腐病 黒とう病 うどんこ病 褐斑病 さび病												
キャベツ	菌核病 株腐病 根朽病												
はくさい	黒斑病 白斑病 菌核病 尻腐病												
ブロッコリー	菌核病 黒すす病												
にら	白斑葉枯病 さび病 白絹病	2000~4000	2000	収穫7日前まで	1回	散布	1回						
にら(花茎)	白斑葉枯病 さび病 白絹病			収穫前日まで	2回以内		3回以内	3回以内					
しそ	灰色かび病			収穫3日前まで									
しそ(花穂)				収穫前日まで	3回以内		4回以内						
セルリー	斑点病 菌核病			収穫前日まで									
しょうが	白星病			収穫7日前まで	3回以内		4回以内						
にんじん	黒葉枯病												
アスパラガス	茎枯病 褐斑病 斑点病			2000	2000		収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内			
きゅうり	灰色かび病 菌核病 うどんこ病												
メロン	つる枯病 うどんこ病			2000	2000		収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内			
すいか	菌核病 つる枯病 うどんこ病												
かぼちゃ	うどんこ病 つる枯病												
ズッキーニ にがうり	うどんこ病												
ししとう	灰色かび病 うどんこ病 黒枯病												
いちご	灰色かび病 うどんこ病 輪班病												
オクラ	灰色かび病 うどんこ病												
トマト	灰色かび病 菌核病 葉かび病 すすかび病												
ミニトマト	うどんこ病	2000	1L/株			株元灌注					散布		
	灰色かび病 菌核病 斑点病 葉かび病 すすかび病												
ピーマン	灰色かび病 黒枯病	2000~4000	100~ 300L/10a	株元灌注	散布								
	白絹病												
なす	灰色かび病 菌核病 すすかび病 うどんこ病	1000~2000	1L/m <sup>2</sup>	生育期 但し、 収穫14日前まで	2回以内	株元灌注	4回以内 (株元灌注は2回 以内、 散布は2回以内)						
ねぎ	白絹病 黒腐菌核病												
	さび病 黒斑病 小菌核腐敗病 白絹病 葉枯病												
たまねぎ	灰色かび病 灰色腐敗病 小菌核病												
レタス 非結球レタス	すそ枯病 灰色かび病 菌核病							2000	100~ 300L/10a	収穫前日まで	4回以内	散布	4回以内
パセリ	うどんこ病												
食用ぎく	灰色かび病 白さび病												
豆類(未成熟) 豆類(種実、ただ し、らっかせいを除 く)	灰色かび病 菌核病 さび病												
いんげんまめ	灰色かび病 菌核病							200~400	ペーパーポット 1冊当り1L (3L/m <sup>2</sup> )	移植前	1回	苗床灌注	4回以内(苗床灌 注は1回以内、散 布は3回以内)
てんさい	根腐病												
	葉腐病												
花き類・観葉植物 (きく、ゆり、チュ ーリップを除く)	灰色かび病												
チューリップ	灰色かび病 褐色斑点病	2000	100~ 300L/10a	発病初期	3回以内	散布	3回以内						
きく	白さび病 灰色かび病												
ゆり	葉枯病 灰色かび病												