

ナティーボフロアブル

作物名	適用病害名	希釈倍数(倍)	使用液量(L/10a)	使用時期	使用方法	本剤の使用回数	総使用回数*	
							テブコナゾール	トリフロキシストロビン
小麦	雪腐小粒菌核病	1000	60~150	根雪前	散布	1回	3回以内 (根雪前は1回以内、 融雪後は2回以内)	3回以内 (根雪前は1回以内、 融雪後は2回以内)
	赤かび病			収穫21日前まで		2回以内		
かんきつ	黒点病	1500~2000	200~700	収穫前日まで	散布	3回以内	3回以内	3回以内
	貯蔵病害(緑かび病) 貯蔵病害(青かび病) 炭疽病(さび果)	1500						
	そうか病 灰色かび病	1500~2000						
	黒点病 貯蔵病害(緑かび病) 貯蔵病害(青かび病) 炭疽病(さび果) そうか病 灰色かび病	24	4~6					
		32	6~7.5					
		50	7.5~15					
		100	15~30					
200	30~50							
もも	灰星病 炭疽病 うどんこ病 黒星病	2000	200~700	散布	無人航空機 による散布	3回以内	3回以内	3回以内
	灰色かび病 落葉病 炭疽病 うどんこ病							
かき	灰色かび病 落葉病 炭疽病 うどんこ病	2000	200~700	散布	散布	2回以内	2回以内	2回以内
うめ	黒星病 すす斑病					2回以内		2回以内