

アドマイヤー1粒剤							
作物名	適用害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	イマダクロブリドを含む農薬の総使用回数	使用方法	
稲	ツマグロヨコバイ ウンカ類	3kg/10a	収穫7日前まで	2回以内	3回以内 (は種時(直播)又は 移植時までの処理は1回以内、 本田での散布は2回以内)	散布	
かんきつ(苗木)	ミカンハモグリガ	20g/樹 (但し、6kg/10aまで)	育苗期	1回	1回	株元散布	
えだまめ	アブラムシ類	セル成型育苗トレイ 1箱またはペーパーポット 1冊(30×6cm、使用土 壤1.5~4L)当り50g	は種時		3回以内 (定植時及びは種時の 土壌混和は合計1回以内、 散布は2回以内)	本剤の所定量をセル 成型育苗トレイまたは ペーパーポットの培土に 均一に混和する	
		3kg/10a					播溝土壌混和
さやいんげん	アブラムシ類	2g/植穴 (但し、6kg/10a まで)	定植時		3回以内 (定植時及びは種時の 土壌混和は合計1回以内、 散布は2回以内)	植穴土壌混和	
		1~2g/株 (但し、6kg/10aまで)	定植時又はは種時		3回以内 (定植時及びは種時の 土壌混和は合計1回以内、 散布は2回以内)	植穴土壌混和	
未成熟そらめめ	アブラムシ類	2g/植穴 (但し、6kg/10a まで)	定植時		3回以内 (定植時及びは種時の 土壌混和は合計1回以内)	播溝土壌混和	
		3kg/10a	は種時		3回以内 (定植時及びは種時の 土壌混和は合計1回以内)	播溝土壌混和	
豆類 (未成熟、ただし、 さやいんげん、 未成熟そらめめを除く)	アブラムシ類	2g/植穴 (但し、6kg/10a まで)	定植時		3回以内 (定植時及びは種時の 土壌混和は合計1回以内、 散布は2回以内)	植穴土壌混和	
		3kg/10a	は種時		3回以内 (定植時及びは種時の 土壌混和は合計1回以内、 散布は2回以内)	播溝土壌混和	
きゅうり		1g/株	育苗期後半		4回以内 (育苗期の株元散布及び 定植時の土壌混和は合計 1回以内、散布及び常温煙霧は 合計3回以内)	株元散布	
	アザミウマ類	1~2g/株				植穴又は 株元土壌混和	
	コナジラミ類	2g/株				植穴土壌混和	
すいか	アブラムシ類	5g/株 (但し、3kg/10aまで)	定植時		4回以内 (定植時の土壌混和は 1回以内、散布は3回以内)	株元土壌混和	
		1~5g/株 (但し、3kg/10aまで)				植穴土壌混和	
メロン	アザミウマ類	1~2g/株	育苗期後半		4回以内 (育苗期の株元散布及び 定植時の土壌混和は合計 1回以内、散布は3回以内)	植穴又は 株元土壌混和	
	アブラムシ類	1g/株				株元散布	
	コナジラミ類						
かぼちゃ	コナジラミ類 アザミウマ類	2g/株	定植時	3回以内 (定植時の土壌混和は 1回以内、散布は2回以内)	植穴土壌混和		
	コナジラミ類	0.5~1g/株	育苗期後半	3回以内 (育苗期の株元散布及び 定植時の土壌混和は合計 1回以内、散布は2回以内)	株元散布		
トマト ミニトマト	アブラムシ類 コナジラミ類	1~2g/株	定植時	3回以内 (定植時の土壌混和は合計 1回以内、散布は2回以内)	植穴土壌混和		
	アブラムシ類	1g/株	育苗期後半	3回以内 (育苗期の株元散布及び 定植時の土壌混和は合計 1回以内、散布及び常温煙霧は 合計2回以内)	株元散布		
なす	アブラムシ類	1g/株	育苗期後半	3回以内 (育苗期の株元散布及び 定植時の土壌混和は合計 1回以内、散布及び常温煙霧は 合計2回以内)	植穴又は 株元土壌混和		
	アザミウマ類	1~2g/株	定植時		株元散布		
ピーマン とうがらし類	アブラムシ類	1g/株	育苗期後半	3回以内 (育苗期の株元散布及び 定植時の土壌混和は合計 1回以内、散布は2回以内)	株元散布		
	アザミウマ類	1~2g/株			植穴又は 株元土壌混和		
わけぎ あさつき	アザミウマ類	4kg/10a	定植時	3回以内 (定植時の土壌混和は 1回以内、散布は2回以内)	植溝土壌混和		
ねぎ							
はくさい	アブラムシ類	0.5g/株	定植時	3回以内 (定植時までの処理は 1回以内、定植後の処理は2回以 内)	植穴土壌混和		
だいこん		3~6kg/10a	は種時	3回以内 (は種時の土壌混和は 1回以内、 は種後の処理は2回以内)	播溝土壌混和		
いちご			0.5g/株	育苗期後半	1回	株元散布	
	アザミウマ類	定植時		植穴土壌混和			
パセリ	アブラムシ類	3kg/10a	は種時	2回以内 (定植時までの処理は1回以内、 散布は1回以内)	播溝散布		
			収穫14日前まで		株元散布		
こんにやく	アブラムシ類	3~6kg/10a	培土時(基根伸長期)	3回以内 (培土時の土壌混和は 1回以内、散布は2回以内)	株元土壌混和		
		6kg/10a	生育期 但し収穫21日前まで		2回以内	茎葉散布	
ごぼう	アブラムシ類	4kg/10a	は種時	3回以内 (は種時の土壌混和は1回以内、 散布は2回以内)	播溝土壌混和		
			収穫7日前まで		2回以内	株元散布	
さといも さといも(葉柄)	アブラムシ類	4kg/10a	植付時	3回以内 (植付時の土壌混和は 1回以内、植付後の処理は2回以 内)	植溝土壌混和		
ばれいしょ							
れんこん	イネネクイハムシ	3kg/10a	収穫14日前まで	3回以内 (植付時の土壌混和は 1回以内、植付後の処理は2回以 内)	散布		
	クワイクビレアブラムシ	4kg/10a				2回以内	
たばこ	アブラムシ類	3kg/10a (1g/株)	植付時	2回以内 (植付時までの処理の土壌混和は 1回以内、散布は1回以内)	植穴土壌混和		
やまのいも	コガネムシ類	4kg/10a				3回以内 (植付時までの処理は1回以内、 植え付け後の処理は2回以内)	植溝土壌混和
やまのいも(むかご)						1回	植穴土壌混和
まくわうり	アブラムシ類	1g/株	定植時	3回以内 (植付時までの土壌混和は 1回以内、散布は2回以内)	作条土壌混和		
かんしょ	コガネムシ類	4kg~6kg/10a	植付前		全面土壌混和		
		6kg/10a					
じゅんさい (適用場所:じゅんさい田)	ユスリカ類	3kg/10a	収穫前日まで	2回以内	2回以内	散布	
ごま	アブラムシ類		は種時	1回	播溝土壌混和		
にら	アザミウマ類	4kg/10a	定植時	2回以内 (定植時の土壌混和は1回以内、 株元散布は1回以内)	植溝土壌混和		
にら(花茎)	ネギアザミウマ		収穫30日前まで		株元散布		
			収穫30日前まで		植溝土壌混和		
レタス	アブラムシ類	0.5g/株	育苗期後半	3回以内 (定植時までの処理は 1回以内定植後の処理は2回以内)	株元散布		
キャベツ			定植時		3回以内 (定植時までの処理は1回以内、定 植後の処理は2回以内)	植穴土壌混和	
					4回以内 (育苗期の灌水は1回以内、 定植時の土壌混和は 合計1回以内、定植後の処理は2 回以内)		
ブロッコリー						3回以内 (は種時の土壌混和は1回以内、 散布は2回以内)	播溝土壌混和
ほうれんそう かぶ		4kg/10a	は種時	2回以内 (定植時の土壌混和は1回以内)	植穴又は 株元土壌混和		
にがうり		1~2g/株	定植時				
花き類・観葉植物 (きく、ばら、ペチュニア、 レザーファンを除く)	アブラムシ類	2g/株 (但し、6kg/10aまで)	生育期	5回以内	株元散布		
きく		3kg/10a			散布		
ペチュニア		2g/株 (但し、6kg/10aまで)			定植時	1回	株元散布
	1g/株 (但し、3kg/10aまで)	植穴土壌混和					
レザーファン	アザミウマ類	1g/株 (但し、3kg/10aまで)	生育期	5回以内	株元土壌混和		
ポインセチア	アブラムシ類	2g/株 (但し、6kg/10aまで)			株元散布		
	コナジラミ類	1g/株 (但し、3kg/10aまで)			株元土壌混和		
ばら	イバラヒゲナガアブラムシ	2g/株 (但し、6kg/10aまで)	発生初期	5回以内	5回以内 (株元灌水は2回以内、 土壌混和は2回以内)	株元散布	
	アブラムシ類						
つつじ類	ツツジゲンバイ	6kg/10a	発生初期	5回以内	2回以内	作条土壌混和	
樹木類 (つつじを除く)	コガネムシ類	4kg/10a	植付時又は植替時				
			植付時				