

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フェンプロパトリンを含む農薬の総使用回数	
かんきつ	アブラムシ類 ミノガ類	1000～2000倍	200～ 700L/10a	収穫7日前まで	4回以内	散布	9回以内 (噴射は5回以内、 散布及びくん煙は 合計4回以内)	
	チャノキイロアザミウマ	2000倍						
	ハスモンヨトウ	1000倍						
りんご	シンクイムシ類 キンモンホソガ アブラムシ類 ハマキムシ類 カメムシ類	1000～1500倍		1000倍	収穫前日まで		2回以内	7回以内 (噴射は5回以内、 散布は2回以内)
	ナミハダニ リンゴハダニ ギンモンハモグリガ							
なし	アブラムシ類 シンクイムシ類 ハマキムシ類	1000～1500倍		1000倍	収穫前日まで		5回以内	10回以内 (噴射は5回以内、 散布は5回以内)
	カメムシ類 ハダニ類							
もも	モモハモグリガ	1000～2000倍		1000倍	収穫前日まで		2回以内	7回以内 (噴射は5回以内、 散布2回は以内)
	アブラムシ類 シンクイムシ類							
すもも	シンクイムシ類	2000倍		2000倍	収穫21日前まで		2回以内	8回以内 (噴射は5回以内、 散布は3回以内)
ぶどう	チャノキイロアザミウマ							
かき	カキノヘタムシガ チャノキイロアザミウマ カキクダアザミウマ カメムシ類 ハマキムシ類	1500倍	2000倍	収穫7日前まで	3回以内	7回以内 (噴射は5回以内、 散布は2回以内)		
おうとう	ケムシ類							
うめ	アブラムシ類 ノコメトガリキリガ	2000～4000倍	2000倍	収穫7日前まで	3回以内	8回以内 (噴射は5回以内、 散布は3回以内)		
びわ	ビワキジラミ アブラムシ類 カメムシ類	2000倍					2000倍	収穫前日まで