

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	インドキサカルブ及びインドキサカルブMPを含む農薬の総使用回数		
キャベツ	コナガ アオムシ	1000～2000倍	100～ 300L/10a	収穫7日前まで	2回以内	散布	2回以内		
	ヨトウムシ ハスモンヨトウ タマナキンウワバ ハイマダラノメイガ	2000倍							
	ヨトウムシ ハスモンヨトウ タマナキンウワバ ハイマダラノメイガ コナガ アオムシ	10倍	1～2L/10a					無人航空機による散布	
はくさい	コナガ アオムシ	1000～2000倍	100～ 300L/10a	収穫21日前まで	2回以内	散布	2回以内		
	ヨトウムシ ハイマダラノメイガ カブラハバチ シロイチモジヨトウ	2000倍							
	ヨトウムシ ハイマダラノメイガ カブラハバチ シロイチモジヨトウ コナガ アオムシ	10倍	1～2L/10a					無人航空機による散布	
だいこん	コナガ アオムシ ヨトウムシ ハイマダラノメイガ カブラハバチ	2000倍	100～ 300L/10a	収穫14日前まで	2回以内	散布	2回以内		
ブロッコリー	コナガ アオムシ	20倍	1～2L/10a	収穫7日前まで				無人航空機による散布	
ねぎ	シロイチモジヨトウ	1000倍	100～ 300L/10a	収穫7日前まで	2回以内	散布	2回以内		
		10倍	1～2L/10a					無人航空機による散布	
いちご	ハスモンヨトウ オオタバコガ	2000倍	100～ 300L/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内		
なす	ハスモンヨトウ オオタバコガ テントウムシダマシ類								
トマト	ハスモンヨトウ オオタバコガ								
ピーマン	オオタバコガ			収穫7日前まで				無人航空機による散布	
レタス 非結球レタス	ハスモンヨトウ オオタバコガ ヨトウムシ								
えだまめ	ハスモンヨトウ			8～16倍				800ml/10a	無人航空機による散布
だいず									
かんしょ	ハスモンヨトウ ナカジロシタバ	2000倍	100～ 300L/10a	散布					
さといも	ハスモンヨトウ								
しょうが	ハスモンヨトウ アワノメイガ	20倍	1～2L/10a	無人航空機による散布					
たばこ	タバコアオムシ ヨトウムシ	2000倍	100～ 180L/10a	収穫10日前まで	1回	散布	1回		
きく	ハスモンヨトウ オオタバコガ		100～ 300L/10a	発生初期	4回以内		4回以内		
樹木類(さくらを除く)	ケムシ類	4000倍	200～ 700L/10a			成虫発生初期			
さくら	クビアカツヤカミキリ	1000倍							