

グレーシア乳剤

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤及びフルキサメタミドを含む農薬の総使用回数	使用方法
さといも	ハスモンヨトウ	2000～3000倍	100～300L /10a	収穫7日前まで	2回以内	散布
かんしょ	ナカジロシタバ ハスモンヨトウ コナジラミ類 ハダニ類					
だいこん	コナガ アオムシ ハイマダラノメイガ カブラハバチ キスジノミハムシ					
はくさい	コナガ アオムシ ハスモンヨトウ ヨトウムシ ハイマダラノメイガ オオタバコガ ネギアザミウマ					
キャベツ	コナガ アオムシ ウワバ類 ヨトウムシ ハスモンヨトウ オオタバコガ アザミウマ類 ハイマダラノメイガ					
カリフラワー	コナガ アオムシ ネギアザミウマ ハスモンヨトウ					
ブロッコリー	コナガ アオムシ ヨトウムシ ハスモンヨトウ ウワバ類 オオタバコガ ハイマダラノメイガ ネギアザミウマ	2000倍	収穫3日前まで			
レタス 非結球レタス	ヨトウムシ ハスモンヨトウ オオタバコガ ナモグリバエ アザミウマ類					
たまねぎ	ネギハモグリバエ ネギアザミウマ	2000～3000倍	収穫7日前まで			
ねぎ	ネギコガ ハモグリバエ類 シロイチモジヨトウ アザミウマ類 クロバネキノコバエ類					
トマト ミニトマト	ハスモンヨトウ オオタバコガ コナジラミ類 アザミウマ類 トマトサビダニ ハモグリバエ類	2000倍	100～300L /10a	収穫前日まで	2回以内	散布
ピーマン	オオタバコガ アザミウマ類 コナジラミ類 ハダニ類 チャノホコリダニ					
なす	コナジラミ類 アザミウマ類 ハダニ類 チャノホコリダニ ハスモンヨトウ オオタバコガ ハモグリバエ類					
きゅうり	アザミウマ類 ハスモンヨトウ ウリノメイガ ハダニ類 コナジラミ類 ハモグリバエ類					
すいか	オオタバコガ ウリノメイガ アザミウマ類 コナジラミ類 ハダニ類 ハスモンヨトウ					
メロン	アザミウマ類 コナジラミ類 ウリノメイガ ハダニ類 ハモグリバエ類					
だいず	マメシンクイガ ハスモンヨトウ ハモグリバエ類 ウコンノメイガ オオタバコガ フタスジヒメハムシ	2000～3000倍	100～300L /10a	収穫14日前まで	2回以内	散布
豆類(未成熟、ただし、えだまめ、除く)	ハスモンヨトウ ハモグリバエ類					
えだまめ	マメシンクイガ ハスモンヨトウ ハモグリバエ類 ウコンノメイガ オオタバコガ フタスジヒメハムシ	2000倍	200～400L /10a	収穫前日まで	1回	散布
いちご	アザミウマ類 ハスモンヨトウ ハダニ類 オオタバコガ					
茶	チャノコカクモンハマキ チャノカマキ チャノキイロアザミウマ チャノミドリヒメヨコバイ マダラカサハラハムシ ヨモギエダシヤク チャノホソガ チャトゲコナジラミ	2000～3000倍	100～300L /10a	発生初期	2回以内	散布
きく	ハスモンヨトウ ハダニ類 オオタバコガ アザミウマ類					
りんどう	リンドウホソハマキ ハダニ類 アザミウマ類	2000倍	—	植付前	1回	30分間種球浸漬
ゆり	ネダニ類					