

コロマイト乳剤

作物名	適用病害虫名	希釈倍数(倍)	10a当りの使用液量(L)	使用時期	使用方法	本剤およびミルベメクテンを含む農薬の総使用回数
りんご	ハダニ類 キンモンホソガ リンゴサビダニ ユキヤナギアブラムシ	1000	200~700	収穫前日まで	散布	1回
もも ネクタリン	ハダニ類 モモサビダニ			収穫7日前まで		
小粒核果類 いちじく	ハダニ類			収穫前日まで		
なし	ニセナシサビダニ			収穫前日まで		
おうとう	ハダニ類	1000~1500	100~150	収穫7日前まで		
パパイヤ		1000		収穫7日前まで		
あずき		1000~2000		収穫14日前まで		
だいず いんげんまめ		1500		収穫7日前まで		
豆類(未成熟)	ハダニ類	1000~1500	収穫前日まで			
いちご(親株床)			仮植前まで			
なす			ハダニ類 ハモグリバエ類 コナジラミ類 チャノホコリダニ	1500		収穫前日まで
トマト ミニトマト	トマトサビダニ コナジラミ類 ハモグリバエ類	1000	100~300	収穫前日まで		
ピーマン	ハダニ類 コナジラミ類			1000~1500		収穫前日まで
ししとう 甘長とうがらし	コナジラミ類			2000		収穫前日まで
きゅうり	ハダニ類 コナジラミ類 チャノホコリダニ	1000~1500	100~300	収穫前日まで		
	ハモグリバエ類	1000		収穫3日前まで		
きゅうり(花) きゅうり(葉)	ハダニ類 コナジラミ類	1500	1000	収穫7日前まで		
食用へちま	ハダニ類	1000	100~300	収穫前日まで		
すいか				収穫7日前まで		
メロン	ハダニ類 ハモグリバエ類 コナジラミ類	2000	100~300	収穫前日まで		
しそ科葉菜類 (えごま(葉)、しそを除く)	ハダニ類			1回		
えごま(葉)	サビダニ類 チャノホコリダニ ハダニ類			2回以内		
しそ	ハダニ類	1500	300	収穫前日まで		
しそ(花穂)				1回		
モロヘイヤ				2000	2回以内	
エンサイ				1500	2回以内	
ふだんそう				1000	2回以内	
アスパラガス				2000	1回	
さんしょう(葉) なんてん(葉)	シクラメンホコリダニ	1000	100~300	収穫7日前まで		
せり科葉菜類 (みつば、コリアンダー(葉)セルリー、せり(水耕栽培)、あしたばを除く)	ハダニ類	2000	100~300	収穫3日前まで		
みつば				収穫3日前まで ただし、伏せ込栽培は伏せ込前まで	2回以内	
コリアンダー(葉)				収穫前日まで	1回	
セルリー				収穫3日前まで	2回以内	
せり(水耕栽培) 適用場所:ガラス室の等の施設				収穫前日まで	1回	
あしたば				1回		
かんしょ さといも さといも(葉柄) はすいも(葉柄)	ハダニ類	1000	100~500	収穫前日まで		
やまのいも やまのいも(むかご)				収穫7日前まで		
みょうが(花穂)	ハダニ類	1000	100~400	収穫前日まで	散布、但し、花穂の発生期にはマルチフィルム被覆により散布液が直接花穂に飛散しない状態で使用する	
みょうが(茎葉)				みょうが(花穂)の収穫前日まで、但し、花穂を収穫しない場合にあっては開花期終了まで		
食用金魚草 食用なでしこ しょくようほおずき 食用ミニバラ	ハダニ類	2000	100~300	収穫前日まで	散布	1回
食用プリムラ 食用カーネーション 食用エキネザカム 食用トレニア 食用パンジー				収穫前日まで		
きく(葉)				ハモグリバエ類 ハダニ類		
きく	ハダニ類	1000~1500	100~200	—		
宿根かすみそう				—		