

サンマイトフロアブル

作物名	適用病害虫名	希釈数 (倍)	10a当り 散布液量 (L)	使用時期	使用方法	本剤およびピリダベンを含む農薬の総 使用回数
かんしょ	ハダニ類 コナジラミ類	1000~1500		収穫前日まで	散布	2回以内
さといも	ハダニ類			収穫21日前まで		
えだまめ	コナジラミ類	1000		収穫14日前まで		1回
あずき	ハダニ類	1000~2000		収穫7日前まで		2回以内
きゅうり	ハダニ類 コナジラミ類 アブラムシ類 うどんこ病	1000~1500		収穫前日まで		
すいか メロン				収穫3日前まで		
かぼちゃ	コナジラミ類 うどんこ病			収穫前日まで		
うり類(漬物用、 ただし、 しろうりを除く)	アブラムシ類 ハダニ類			収穫前日まで		
ピーマン	コナジラミ類			収穫開始3日前ま で		
いちご	ハダニ類 ワタアブラムシ チャノホコリダニ シクラメンホコリダニ コナジラミ類			1000		収穫前日まで
みょうが(花穂)	ハダニ類	1000	みょうが(花穂)の 収穫前日まで 但し、花穂を収穫 しない場合に あつては開 花期終了まで			
みょうが(茎葉)			収穫75日前まで	散布	1回	
せんぶり	シクラメンホコリダニ	1000~1500	収穫21日前まで			
しそ	ハダニ類 シソサビダニ	2000	収穫14日前まで			
しそ(花穂)			収穫21日前まで			
食用ぎく	アブラムシ類 ハダニ類	1000	収穫30日前まで		2回以内	
きく(葉)	ハダニ類	2000	定植前			
ししとう	コナジラミ類	1000~1500	収穫前日まで			
にがうり		1500	収穫3日前まで			
しよくようほおずき			収穫14日前まで			
ふき		1000	400	摘採14日前まで		
茶	カンザワハダニ チャノキイロアザミウマ	1000~2000	200~400			
	チャノミドリヒメヨコバイ チャノナガサビダニ チャノホコリダニ					
きく	アブラムシ類 ハダニ類	1000	100~300	-		
カーネーション	ハダニ類					
ポインセチア	コナジラミ類					