作物名	適用害虫名	希釈倍数 (倍)	散布液量 (L/10a)	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	フェンピロキ シメートを 含む農薬の 総使用回数
りんご	リンゴハダニ ナミハダニ	1000~2000		収穫30日前まで	1回		1回
かんきつ	リンゴサビダニ ミカンサビダニ ミカンハダニ	2000		収穫前日まで	2回以内		2回以内
なし	ハダニ類 ニセナシサビダニ	1000~2000		収穫14日前まで	1回		1回
ŧŧ							
すもも ネクタリン うめ	ハダニ類	1000		収穫7日前まで	2回以内		2回以内
 ぶどう			200~700	 収穫30日前まで			
アセロラ	ブドウサビダニ	2000		収穫14日前まで	1回		1回
おうとう	ハダニ類	1000			2回以内		2回以内
かき		1000~2000		収穫7日前まで			
びわ	ビワサビダニ	1000					
いちじく	イチジクモンサビダニ	2000		収穫3日前まで	1回		
キウイフルーツ	ハダニ類 	1000~2000		収穫前日まで			
チェリモヤ	カンザワハダニ	2000		収穫30日前まで		†	
あずき いんげんまめ えんどうまめ べにばないんげん 豆類 (未成熟、	ハダニ類	1000~2000		収穫7日前まで		散布	1 🛭
但し、さやいんげ ん を除く)	チャノホコリダニ	1000			1回		
さやいんげん	ハダ二類	1000~2000		収穫前日まで 収穫3日前まで			
いちご	チャノホコリダニ	1000		校復3日前よし			
すいか メロン		1000~2000		収穫前日まで			
きゅうり なす	ハダニ類	2000		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
ピーマン		1000~2000					
トマト	トマトサビダニ タバココナジラミ類 (シルバーリーフコナジ ラミを含む)	1000	150~300	収穫開始 14日前まで	3回以内		3回以内
とうがらし類 モロヘイヤ ほうれんそう しそ	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7			収穫前日まで 収穫7日前まで 収穫21日前まで 収穫28日前まで			2回以内
はすいも(葉柄)	ハダニ類	2000		収穫前日まで	1@	散布、但し花 穂の発生期に はマルチフイ ルム被液が直 接花穂に飛散 しない状態で 使用する	10
みょうが(茎葉)				みょうが(花穂)の 収穫前日まで 但し、花穂を収穫し ない場合にあって は開花期終了まで			
食用さくら(葉)	ナミハダニ		100~300	収穫7日前まで			
ホップ	ハダニ類		200~700	収穫14日前まで		散布	
	クワシロカイガラムシ	1	1000				
茶	カンザワハダニ チャノミドリヒメヨコバイ チャノホソガ チャノホコリダニ	1000	400	摘採7日前まで	2回以内		2回以内
 花き類・観葉植物	 ハダニ類	1000~2000	150~300	発生初期 発生初期	1回	1	 6回以内