

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用量	使用時期	使用方法	本剤及びエトキサゾールを含む農薬の総使用時回数
かんきつ(みかんを除く)	ミカンハダニ	2000～3000倍	200～700L/10a	収穫14日前まで	散布	2回以内
	ミカンサビダニ	2000倍				
みかん	ミカンハダニ	2000～3000倍		収穫前日まで		
	ミカンサビダニ	2000倍				
りんご	リンゴハダニ	2000～3000倍		収穫14日前まで		
	ナミハダニ	2000倍				
なし	ハダニ類			収穫7日前まで		
もも	ハダニ類 モモサビダニ					
すもも ネクタリン	ハダニ類					
ぶどう	ミカンハダニ			1回		
びわ			2回以内			
おうとう	ハダニ類		収穫14日前まで	1回		
いちじく			収穫前日まで			
マンゴー			収穫7日前まで			
きゅうり	ハダニ類		2000倍	100～350L/10a	収穫前日まで	1回
すいか メロン		2回以内				
なす いちご		100～300L/10a	1回			
とうがん				2回以内		
しそ						
きく(葉) かんしょ						
みつば		収穫前日まで ただし、伏せ込み栽培は伏せ込み前まで				
あずき		収穫7日前まで				
食用ミニバラ		収穫3日前まで	1回			
茶		カンザワハダニ		1000～3000倍	200～400L/10a	摘採14日前まで
ホップ	ハダニ類	2000倍	200～700L/10a	収穫7日前まで	1回	
花き類・観葉植物			100～300L/10a	発生初期		
樹木類			200～700L/10a			