

マイトコーネフロアブル

作物名	適用害虫名	希釈倍数 (倍)	散布液量 (L/10a)	使用時期	本剤の 使用回数	使用 方法	ビフェナゼート を含む農薬の 総使用回数				
かんきつ	ミカンハダニ ミカンサビダニ	1000~1500	200~700	収穫7日前まで	1回	散布	1回				
りんご	ナミハダニ	1000		200~700				収穫前日時まで			
	リンゴハダニ										
なし	ハダニ類	1000~1500									
もも		モモサビダニ							1000		
おうとう	ハダニ類	1000~1500							収穫14日前まで		
ネクタリン 小粒核果類									収穫3日前まで		
ぶどう									ブドウサビダニ	1000	収穫21日前まで
										1000~1500	収穫7日前まで
マンゴー アテモヤ	ハダニ類	1000							収穫前日時まで		
あけび(果実)									収穫7日前まで		
いちじく									収穫前日時まで		
アテモヤ									収穫7日前まで		
さといも かんしょ やまのいも			収穫3日前まで								
いちご	1000	1000	100~300	収穫前日時まで	2回以内	2回以内					
すいか メロン きゅうり なす ピーマン											
トマト ミニトマト					ハダニ類 トマトサビダニ						
みょうが (花穂)	ハダニ類	1500	100~300	みょうが(花穂)の 収穫前日時まで 但し、花穂を収穫し ない場合にあつて は開花期終了まで	1回	散布、但し花穂 の発生期には マルチフィルム 被覆により散布 液が直接花穂 に飛散しない状 態で使用する	1回				
みょうが (茎葉)											
しそ科葉菜類 (えごま(葉)を 除く)、 しそ(花穂)								収穫3日前まで			
さんしょう(葉)								収穫14日前まで			
ホップ								200~700	200~700	収穫14日前まで	
茶	カンザワハダニ チャノナガサビダニ	1000	200~400	摘採14日前まで 但し遮光する栽 培では遮光開始 14日前まで							
食用ミニバラ	ハダニ類	1500	100~300	収穫前日時まで	1回	散布	1回				
しよくよう ほおずき											
きく	ナミハダニ	1000	100~300	開花前まで							
りんどう	ハダニ類										
げっきつ					発生初期						