アンビルフロアブル

<table>
<tr><th>作物名</th><th>適用病害名</th><th>希釈倍数
（倍）</th><th>使用液量
（L/10a）</th><th>使用時期</th><th>使用回数*</th><th>使用方法</th></tr>
<tr><td rowspan="2">りんご</td><td>斑点落葉病
モニリア病
褐斑病</td><td>1000</td><td rowspan="9">200～700</td><td rowspan="3">収穫7日前まで</td><td rowspan="6">3回以内</td><td rowspan="15">散布</td></tr>
<tr><td>赤星病
黒星病
うどんこ病</td><td>1000～2000</td></tr>
<tr><td rowspan="2">なし</td><td>輪紋病</td><td rowspan="2">1000</td></tr>
<tr><td>もも
ネクタリン</td><td>灰星病
黒星病</td><td>収穫前日まで</td></tr>
<tr><td>かき</td><td>うどんこ病</td><td>1000～2000</td><td rowspan="2">収穫7日前まで</td></tr>
<tr><td>おうとう</td><td rowspan="3">灰星病</td><td rowspan="6">1000</td><td>1回</td></tr>
<tr><td>すもも</td><td>収穫前日まで</td><td rowspan="3">2回以内</td></tr>
<tr><td>あんず</td><td>収穫7日前まで</td></tr>
<tr><td>いちじく</td><td>さび病</td><td>収穫前日まで</td></tr>
<tr><td>きく</td><td>白さび病
うどんこ病</td><td rowspan="3">150～300</td><td rowspan="9">発病初期</td><td rowspan="9">7回以内</td></tr>
<tr><td>花き類・観葉植物
（ばら、きくを除く）</td><td rowspan="2">うどんこ病</td></tr>
<tr><td>ばら</td><td>1000～2000</td></tr>
<tr><td>やなぎ</td><td>葉さび病
炭疽病</td><td rowspan="4">1000</td><td rowspan="4">200～700</td></tr>
<tr><td>ぼけ</td><td>赤星病
炭疽病</td></tr>
<tr><td>せいようきんしばい</td><td>さび病
炭疽病</td></tr>
<tr><td>樹木類
（やなぎ、ぼけ、せいようきんしばいを除く）</td><td>炭疽病</td></tr>
</table>