

インターフロアブル

作物名	適用病害名	希釈倍数 (倍)	10a当り 使用液量 (L)	使用時期	本剤及び フェンブコナゾール を含む 農薬の使用回数	使用方法	
りんご	赤星病	8000～12000	200～700	収穫14日前まで	3回以内	散布	
	黒星病 うどんこ病	5000～12000					
	モニリア病	5000					
	褐斑病 黒点病 すす点病 すす斑病	10000					
なし	黒星病	5000～12000		収穫7日前まで			2回以内
	赤星病	8000～12000					
	輪紋病	5000					
	うどんこ病	5000～10000					
かき	炭疽病 落葉病	5000		収穫前日まで			4回以内
もも	黒星病	5000					
	灰星病		2回以内				
おうとう	幼果菌核病				4回以内		
	黒星病		2回以内				
ネクタリン	灰星病				4回以内		
	すもも		2回以内				
うめ	黒星病 すす斑病				2回以内		
あんず	灰星病		収穫21日前まで				
ぶどう	黒とう病 うどんこ病 褐斑病		8000		収穫30日前まで	3回以内	
	灰色かび病			200～700			収穫14日前まで
ブルーベリー	炭そ病 褐色円星病	5000～8000	200～400		摘採7日前まで	2回以内	
	茶	もち病 網もち病		5000			
りんどう	花腐菌核病	200～300	発病初期		5回以内		
	葉枯病						