

オーソサイド水和剤 80

作物名	適用病害名	希釈倍数 (倍) 又は使用量	使用液量 (L/1㎡)	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	キャプタンを含む農薬の 総使用回数
せり科葉菜類(せりを除く)	苗立枯病	800	2	は種後から 2～3葉期まで	2回以内	灌注	3回以内(種子 粉衣は1回以 内、は種後は2 回以内)
トマト きゅうり なす メロン		種子重量の 0.2～0.4%	—	は種前	1回	種子粉衣	5回以内 (種子粉衣は 1回以内)
すいか しろり かぼちゃ		800	2	は種後から2 ～3葉期まで	5回以内	灌注	
ピーマン		種子重量の 0.2～0.4%	—	は種前	1回	種子粉衣	2回以内 (種子粉衣は 1回以内)
とうがらし類		800	2	は種後から2 ～3葉期まで	2回以内	灌注	3回以内 (種子粉衣は1 回以内、 は種後は2回以 内)
オクラ							
しょうが		根茎腐敗病	塊茎重量の 2%	—	植付前	1回	塊茎粉衣
	400		3	収穫30日前ま で	2回以内	灌注	
チューリップ	青かび病	800～1000	—	球根掘取時 及び植付時	8回以内	球根浸漬	8回以内
アイリス				植付前		30分間 球根浸漬	
ゆり	腐敗病	400	植付前または 貯蔵前	1回			