

オーソサイド水和剤 80

作物名	適用病害名	希釈倍数(倍)	使用液量(L/10a)	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	キャプタンを含む農薬の総使用回数
小麦	赤かび病 葉枯症 ふ枯症	600~1000	60~150	収穫14日前まで	4回以内		4回以内
	黒変病 黒点病	1000~1500					
りんご	黒星病	600~1000	200~700	収穫前日まで	6回以内		6回以内
	黒点病	800~1200					
	斑点落葉病 輪紋病 褐斑病 すす点病 すす斑病	600~800					
	炭疽病	800					
なし	黒星病 赤星病 輪紋病	600~1000	200~700	収穫3日前まで	9回以内		9回以内
	炭疽病	800					
	疫病	1000					
ぶどう	晩腐病 褐斑病 灰色かび病 べと病 枝膨病 黒とう病	800	200~700	収穫30日前まで	3回以内		3回以内
もも	縮葉病	600	200~700	発芽前	4回以内		4回以内
おうとう	褐色せん孔病 灰星病 炭疽病	800	200~700	収穫3日前まで	5回以内		5回以内
マルメロ	黒点病	1000	200~700	収穫14日前まで	6回以内		6回以内
小粒核果類	黒星病	800~1000	200~700	収穫21日前まで	3回以内		3回以内
	すす斑症	800					
ブルーベリー	斑点病	500~1000	200~700	収穫21日前まで	2回以内		5回以内 (生育期は2回以内、収穫終了後～落葉期までは3回以内)
	すす点病 灰色かび病	500					
パイナップル	根腐萎凋病		300~400				
パイナップル	黒腐病	600	200~700	収穫14日前まで	3回以内		3回以内
	炭疽病						
マンゴー							
かき	炭疽病 落葉病 すす点病	1000	200~700	収穫7日前まで	4回以内		5回以内
くるみ	炭疽病	800	200~700				4回以内
はくさい	黒斑病 白斑病 苗立枯病	600~1200	100~300	収穫7日前まで	5回以内		6回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は5回以内)
	べと病 炭疽病	600					
トマト	疫病	800~1200	100~300	収穫前日まで	5回以内		5回以内(種子粉衣は1回以内)
	葉かび病 灰色かび病	800					
きゅうり	炭疽病 褐斑病 つる枯病	600~800	100~300	収穫前日まで	5回以内		5回以内(種子粉衣は1回以内)
	べと病	600					
すいか メロン	べと病 つる枯病	600	100~300	収穫14日前まで	5回以内		5回以内(種子粉衣は1回以内)
	炭疽病	400~800					
しろうり かぼちゃ	べと病	600	100~300	収穫前日まで	5回以内		5回以内(種子粉衣は1回以内)
	炭疽病	400~800					
たまねぎ	灰色かび病 白色疫病 苗立枯病	600	100~300	収穫前日まで	2回以内		6回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は5回以内)
葉たまねぎ	苗立枯病			収穫7日前まで			
しょうが	白星病		100~300	収穫3日前まで	2回以内		5回以内(塊茎粉衣は1回以内、灌注は2回以内、散布は2回以内)
いちご	灰色かび病 炭疽病 芽枯病	800	100~300	収穫開始14日前まで	5回以内		5回以内
いんげんまめ	炭疽病	600~1200	100~300	収穫30日前まで	2回以内		3回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は2回以内)
ごぼう	黒斑病	800	100~300	収穫14日前まで	5回以内		6回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は5回以内)
花き類・観葉植物 (ばら、りんどう、 せんいちこう、 コスモス、ひまわり、 シネラリア スイトピー、みやこわすれ アンズリウム 斑入りアマドコロを除く)	茎腐病 立枯病 苗立枯病	600	100~300	—	8回以内		8回以内
ばら	黒星病	800					
	茎腐病 立枯病 苗立枯病						
りんどう	葉枯病 茎腐病 立枯病 苗立枯病						
せんいちこう	斑葉病 茎腐病 立枯病 苗立枯病						
コスモス	そうか病 茎腐病 立枯病 苗立枯病						
ひまわり	べと病 黒斑病 茎腐病 立枯病 苗立枯病	600					
シネラリア	褐斑病 茎腐病 立枯病 苗立枯病						
スイトピー	腰折病 茎腐病 立枯病 苗立枯病						
みやこわすれ アンズリウム	根腐病 茎腐病 立枯病 苗立枯病						
斑入りアマドコロ	斑点病 茎腐病 立枯病 苗立枯病						
ゆきやなぎ	苗立枯病	1000					
せんりょう	炭疽病	600					
芝	葉腐病 (ブラウンパッチ)	300~500					
		500~800	0.5~2L/㎡				
	赤焼病	300~800		1~2L/㎡			
西洋芝(ベントグラス)	炭疽病	300~500	0.5L/㎡				