カスミンボルドー

作物名	適用病害名	希釈倍数（倍）	使用液量（L/10a）	使用時期	本剤の使用回数	カスガマイシンを含む農薬の総使用回数	銅を含む農薬の総使用回数	使用方法
なし	黒星病	1000	200～700	収穫後(10～11月)	2回以内	2回以内	—	散布
もも	せん孔細菌病 縮葉病	500		開花前まで	3回以内	3回以内		
かんきつ（みかんを除く）	かいよう病	1000		収穫45日前まで	5回以内	5回以内		
みかん				収穫7日前まで				
びわ	灰斑病 がんしゅ病			幼果期まで	3回以内	3回以内		
キウイフルーツ	かいよう病 花腐細菌病	500		休眠期	4回以内	4回以内（樹幹注入は1回以内）		
		1000		発芽後叢生期（新梢長約10cm）まで				
きゅうり	斑点細菌病 うどんこ病 べと病		100～300	収穫前日まで	5回以内	5回以内		
すいか	うどんこ病 褐斑細菌病 果実汚斑細菌病							
メロン	うどんこ病 斑点細菌病 果実汚斑細菌病			収穫3日前まで				
トマト	葉かび病 輪紋病 疫病 斑点細菌病 かいよう病 軟腐病			収穫前日まで				
ミニトマト	葉かび病 輪紋病 疫病 斑点細菌病 かいよう病 軟腐病							
ピーマン	斑点細菌病 うどんこ病 斑点病							
たまねぎ	軟腐病			収穫14日前まで	3回以内	3回以内		
だいこん	軟腐病 黒斑細菌病 ワッカ症							
ごぼう	黒斑細菌病							
オクラ	葉枯細菌病			収穫開始7日前まで				
ねぎ	軟腐病			収穫14日前まで	2回以内	2回以内		
にんじん	軟腐病 黒葉枯病 斑点細菌病							
レタス	腐敗病 斑点細菌病			収穫7日前まで	4回以内	4回以内		
非結球レタス								
キャベツ	黒腐病 軟腐病 黒斑細菌病			収穫7日前まで				
セルリー	軟腐病 斑点病				3回以内	3回以内		
メキャベツ	黒腐病			収穫21日前まで				
ブロッコリー				収穫7日前まで	4回以内	4回以内		
なばな類				収穫14日前まで	3回以内	3回以内		
にんにく	春腐病			収穫7日前まで	5回以内	5回以内		
あずき	褐斑細菌病 茎腐細菌病			収穫30日前まで	3回以内	3回以内（種子粉衣は1回以内）		
いんげんまめ	かさ枯病							
ばれいしょ	軟腐病	500～800		収穫7日前まで		4回以内（種いも浸漬は1回以内、植付後は3回以内）		
	疫病	800						
てんさい	褐斑病	800～1000			5回以内	5回以内		
		200	25					
	斑点病 斑点細菌病	800	100～300					
とうがらし類	うどんこ病 斑点細菌病 斑点病	1000		収穫前日まで				
茶	赤焼病 輪班病	500～1000	200～400	摘採14日前まで	2回以内	2回以内		
	新梢枯死症（輪斑病菌による） 褐色円星病 炭疽病	1000						
ばら	うどんこ病		100～300	発病初期	6回以内	6回以内		
ゆり	軟腐病							
ほおずき	軟腐病 斑点細菌病							
たばこ	疫病		100～180	収穫10日前まで	2回以内	2回以内		