

## ストロビーフロアブル

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	使用方法	本剤及びクレンキシムメチルを含む農薬の総使用回数	
麦類 (小麦を除く)	うどんこ病 赤かび病 赤さび病	2000～3000倍	60～150L /10a	収穫14日前まで	散布	3回以内	
小麦	赤かび病	500倍	25L/10a				
やまのいも	葉渋病	2000～3000倍	100～ 300L/10a	収穫7日前まで	無人航空機による散布		
		24倍	3L/10a		散布		
やまのいも (むかご)	葉渋病	2000倍	100～ 300L/10a		無人航空機による散布		
		24倍	3L/10a		散布		
きゅうり	うどんこ病 べと病 褐斑病 炭疽病	3000倍		収穫前日まで	散布		
きゅうり(花)	うどんこ病 べと病 褐斑病			収穫開始 3日前まで			2回以内
すいか	うどんこ病 炭疽病 つる枯病	2000～3000倍		収穫前日まで			3回以内
メロン	うどんこ病 べと病 つる枯病						
かぼちゃ	うどんこ病 べと病	3000倍		収穫7日前まで			
にがうり							
うり類 (漬物用)	うどんこ病 つる枯病 べと病 炭疽病	3000倍		収穫3日前まで			
ズッキーニ	うどんこ病			収穫前日まで			
なす	うどんこ病 すすかび病						
ピーマン	うどんこ病 黒枯病						
とうがらし類 (ししとうを除く)	うどんこ病	4000倍	100～ 300L/10a		収穫前日まで	2回以内	
ししとう	うどんこ病 黒枯病						
はくさい	黒斑病 白斑病 べと病	3000倍		収穫3日前まで	3回以内		
たかな たいさい	白斑病			収穫7日前まで	2回以内		
すいぜんじな	黒斑病	3000倍		収穫14日前まで	3回以内		
タアサイ	白さび病			収穫前日まで			
のざわな	べと病	3000倍		収穫14日前まで	3回以内		
サラダ菜	褐斑病			収穫3日前まで			
おおさきな	黒斑病	3000～5000倍		収穫前日まで	2回以内		
いちご	うどんこ病						
にら にら(花茎)	さび病 白斑葉枯病	3000倍		収穫前日まで	3回以内		
ねぎ	さび病 黒斑病 黄斑病	2000倍				収穫7日前まで	
わけぎ	灰色かび病	3000倍	0.8L/10a 1.6L/10a 3.2L/10a	収穫21日前まで	2回以内		
たまねぎ		2000～3000倍		収穫14日前まで	無人航空機による散布		
		10倍			散布		
		20倍			無人航空機による散布		
		40倍			散布		
にんにく	さび病	2000倍	100～ 300L/10a	収穫7日前まで	無人航空機による散布		
		8倍	0.8L/10a				
		16倍	1.6L/10a				
		32倍	3.2L/10a				
葉にんにく		2000倍	100～ 300L/10a	収穫14日前まで	散布		
なばな類	白さび病	3000～4000倍		収穫前日まで	散布	2回以内	
らっきょう	乾腐病	200倍	—	植付前	30分間種 球浸漬	1回	
にんじん	黒葉枯病	2000～3000倍	100～ 300L/10a	収穫7日前まで	散布	3回以内	
	斑点病	3000倍					
食用ゆり	葉枯病	2000倍					
セルリー	斑点病	3000倍		収穫前日まで			
パセリ	うどんこ病			収穫14日前まで		1回	
しそ	斑点病	4000倍		収穫7日前まで		2回以内	
	灰色かび病	3000倍		収穫前日まで			
さやえんどう 実えんどう	さび病					3000倍	収穫前日まで
しゅんぎく	炭疽病	2000～3000倍		200～ 400L/10a		摘採10日前まで	3回以内
茶	炭疽病 輪斑病 新梢枯死症						
	てんさい	褐斑病	2000～3000倍	100～ 300L/10a	収穫21日前まで		
葉腐病		2000倍	100～500L /10a	収穫前日まで			
アスパラガス	斑点病						
モロヘイヤ	炭疽病	3000倍	100～300L /10a	収穫5日前まで	2回以内		
たばこ	赤星病		100～180L /10a				
食用ぎく	白さび病 黒斑病 褐斑病	3000倍		収穫3日前まで			
きく(葉)				収穫7日前まで			
食用金魚草	さび病	3000倍		収穫7日前まで			
すいぜんじな	黒斑病			収穫14日前まで			
たらのき	そうか病	2000倍	100～ 300L/10a	収穫75日前まで			
食用トレニア	うどんこ病	4000倍		収穫3日前まで			
食用パンジー			3000倍	100～ 300L/10a		収穫7日前まで	
食用西洋 たんぼぼ	3000倍	収穫3日前まで					
チャービル ディル(葉)		収穫45日前まで					
食用かえで(葉)	2000～3000倍				発病初期	3回以内	
きく			白さび病 黒斑病 褐斑病				
アスター			さび病				
りんどう	黒斑病 褐斑病	2000倍	100～ 700L/10a				