

# スミブレード水和剤

作物名	適用病害名	希釈倍数 (倍)	10a当り 散布液量 (L)	使用時期	使用 方法	本剤の使用 回数	ジエトフェンカルブ を含む農薬の 総使用回数	プロシミドン を含む農薬の 総使用回数	
みかん	灰色かび病	2000	200～700	開花期(但し収穫30 日前まで)	散布	3回以内	5回以内	3回以内	
トマト									6回以内
なす	菌核病	1500	150～300	収穫前日まで		5回以内	5回以内	6回以内	
	灰色かび病	1500～2000							
きゅうり	灰色かび病 褐斑病			1500～2000		1500	収穫7日前まで	5回以内	5回以内
	菌核病								
レタス	菌核病 灰色かび病	1000～2000		150～300		収穫7日前まで	5回以内	5回以内	5回以内
たまねぎ	灰色かび病								
いんげんまめ	灰色かび病 菌核病	1500		150～300		収穫21日前まで	2回以内	3回以内	2回以内
すいか	つる枯病	1500～2000					1500	5回以内	5回以内
	菌核病	2000							
ふき	灰色かび病	1500		150～400	収穫14日前まで	2回以内	2回以内	2回以内	
キウイフルーツ	貯蔵病害 (灰色かび病)	2000	200～700	収穫前日まで	4回以内	4回以内	4回以内		
みつば	灰色かび病		—	収穫21日前まで	1回	1回	1回		
つるむらさき	菌核病		150～300		2回以内	2回以内	2回以内		
にがうり	斑点病		100～300	収穫7日前まで					