

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	プロシミドンを含む農薬の使用回数
小麦	雪腐大粒菌核病	1000倍	60～150L/10a	収穫75日前まで	2回以内	散布	2回以内
りんご	モニリア病			収穫90日前まで	4回以内		4回以内
かんきつ (みかんを除く)	灰色かび病	1500～3000倍	200～700L/10a	収穫30日前まで	2回以内		2回以内
みかん					3回以内		3回以内
もも	灰星病	1000～1500倍	収穫3日前まで	3回以内	3回以内		
おうとう		1000～2000倍	収穫14日前まで	1回	1回		
すもも				1500倍	3回以内		3回以内
あんず		1000～2000倍	収穫前日まで	3回以内			
びわ	軸腐病	1000倍	収穫21日前まで	3回以内	3回以内		
ばれいしょ	菌核病	1000～1500倍	100～300L/10a	収穫21日前まで	4回以内		4回以内
だいず		1000～2000倍			2回以内		2回以内
あずき		灰色かび病			1000倍		4回以内
らっかせい	菌核病 灰色かび病	1000～2000倍		2回以内	2回以内		
いんげんまめ	つる枯病	1000倍		収穫前日まで	6回以内		6回以内 (常温煙霧は2回以内)
きゅうり	菌核病 灰色かび病	1000～2000倍		収穫7日前まで	5回以内		5回以内
すいか	菌核病	1000倍		収穫前日まで	3回以内	3回以内	
メロン	菌核病			2000倍	収穫14日前まで	6回以内	6回以内
かぼちゃ	菌核病	1000～2000倍		収穫前日まで	3回以内	3回以内	
ズッキーニ				収穫前日まで	6回以内	6回以内	
トマト	菌核病 灰色かび病	1000倍		収穫前日まで	3回以内	3回以内	
なす	黒枯病				5000倍	6回以内	6回以内
ピーマン	菌核病 灰色かび病	1000倍		5回以内	5回以内		
ししとう	黒枯病	5000倍		4回以内	4回以内		
キャベツ	菌核病	2000～3000倍		収穫14日前まで	4回以内	4回以内	
レタス	菌核病 灰色かび病	1000～2000倍	収穫7日前まで	5回以内	5回以内		
ねぎ	小菌核腐敗病 黒腐菌核病	1000倍	2.4L/10a	収穫21日前まで	3回以内	株元散布	3回以内
たまねぎ	灰色腐敗病 灰色かび病 小菌核病			収穫前日まで	5回以内	散布	5回以内
	灰色かび病	16倍	無人航空機による散布				
にんにく	黒腐菌核病	種球重量の0.4%	—	植付前	1回	種球粉衣 (湿粉衣)	1回
いちご	菌核病 灰色かび病	2000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内
食用へちま	菌核病			収穫7日前まで	2回以内		2回以内
とうがん		1500倍	収穫30日前まで	1回	株元灌注	1回	
にんじん		1000～2000倍	200ml/株				大土寄時
たばこ	菌核病	1000～2000倍	200ml/株	種茎冷蔵保存前	1回	30分間種茎浸漬	
リアトリス		1000倍	—				