トップジン M 水和剤

| 作物名 | 適用病害名 | 希釈倍数（倍） | 10a当り使用液量(L)* | 使用時期 | 本剤の使用回数 | チオファネートメチルを含む農薬の総使用回数 | 使用方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| みかん | そうか病 | 30 | 8 | 4～6月 | 5回以内 | 8回以内（塗布は3回以内、散布、空中散布及び無人航空機散布は合計5回以内） | 空中散布 |
| みかん | そうか病 | 1000～1500 | 200～700 | 収穫前日まで | 5回以内 | 8回以内（塗布は3回以内、散布、空中散布及び無人航空機散布は合計5回以内） | 散布 |
| みかん | 灰色かび病 | 1000～1500 | 200～700 | 収穫前日まで | 5回以内 | 8回以内（塗布は3回以内、散布、空中散布及び無人航空機散布は合計5回以内） | 散布 |
| みかん | 貯蔵病害（青かび病、緑かび病、軸腐病） | 2000～3000 | 200～700 | 収穫前日まで | 5回以内 | 8回以内（塗布は3回以内、散布、空中散布及び無人航空機散布は合計5回以内） | 散布 |
| かんきつ（みかんを除く） | 貯蔵病害（青かび病、緑かび病、軸腐病） | 2000～3000 | 200～700 | 収穫前日まで | 5回以内 | 8回以内（塗布は3回以内、散布及び無人航空機散布は合計は5回以内） | 散布 |
| りんご | 白紋羽病 | 500～1000 | — | 休眠期～生育期 | 1回 | 10回以内（塗布は3回以内、灌注は1回以内 散布は6回以内） | 灌注 |
| りんご | 黒星病 黒点病 褐斑病 うどんこ病 | 1000～2000 | 200～700 | 収穫前日まで | 6回以内 | 10回以内（塗布は3回以内、灌注は1回以内 散布は6回以内） | 散布 |
| りんご | 腐らん病、モニリア病(実腐れ) 輪紋病 すす点病 すす斑病 | 1000～1500 | 200～700 | 収穫前日まで | 6回以内 | 10回以内（塗布は3回以内、灌注は1回以内 散布は6回以内） | 散布 |
| マルメロ かりん | 腐らん病 | 1000～1500 | 200～700 | 収穫前日まで | 6回以内 | 9回以内（塗布は3回以内、散布は6回以内） | 散布 |
| なし | 腐らん病 | 1000 | 200～700 | 収穫前日まで | 6回以内 | 11回以内（塗布は3回以内、休眠期の散布は1回以内、灌注は1回以内、生育期の散布は6回以内） | 散布 |
| なし | 輪紋病 胴枯病 心腐れ症（胴枯病菌） | 1000～1500 | 200～700 | 収穫前日まで | 6回以内 | 11回以内（塗布は3回以内、休眠期の散布は1回以内、灌注は1回以内、生育期の散布は6回以内） | 散布 |
| なし | 黒星病 うどんこ病 | 1000～2000 | 200～700 | 収穫前日まで | 6回以内 | 11回以内（塗布は3回以内、休眠期の散布は1回以内、灌注は1回以内、生育期の散布は6回以内） | 散布 |
| なし | 白紋羽病 | 500～1000 | — | 休眠期 | 1回 | 11回以内（塗布は3回以内、休眠期の散布は1回以内、灌注は1回以内、生育期の散布は6回以内） | 灌注 |
| ぶどう | 黒とう病 灰色かび病 褐斑病 うどんこ病 | 1000～2000 | 200～700 | 収穫45日前まで | 1回以内 | 5回以内（塗布は3回以内、休眠期の散布は1回以内、生育期の散布は1回以内） | 散布 |
| ぶどう | 晩腐病 芽枯病 | 1000 | 200～700 | 収穫45日前まで | 1回以内 | 5回以内（塗布は3回以内、休眠期の散布は1回以内、生育期の散布は1回以内） | 散布 |
| ぶどう | 苦腐病 | 1000～1500 | 200～700 | 収穫45日前まで | 1回以内 | 5回以内（塗布は3回以内、休眠期の散布は1回以内、生育期の散布は1回以内） | 散布 |
| もも | 枝折病 うどんこ病 | 1000 | 200～700 | 収穫前日まで | 6回以内 | 10回以内（塗布は3回以内、休眠期の散布は1回以内、生育期の散布は6回以内） | 散布 |
| もも | 黒星病 灰星病 ホモプシス腐敗病 | 1000～1500 | 200～700 | 収穫前日まで | 6回以内 | 10回以内（塗布は3回以内、休眠期の散布は1回以内、生育期の散布は6回以内） | 散布 |
| かき | 炭疽病 落葉病 うどんこ病 黒星落葉病 すす点病 | 1000～1500 | 200～700 | 収穫前日まで | 6回以内 | 10回以内（塗布は3回以内、休眠期の散布は1回以内、生育期の散布は6回以内） | 散布 |
| 小粒核果類 | 灰星病 環紋葉枯病 葉炭疽病 黒星病 黒粒枝枯病 | 1000～1500 | 200～700 | 収穫21日前まで | 3回以内 | すももは6回以内（塗布は3回以内、休眠期の散布は1回以内、生育期の散布は3回以内）、その他の小粒核果類は6回以内（塗布は3回以内、散布は3回以内） | 散布 |
| おうとう | 灰星病 せん孔病 幼果菌核病 | 1000～1500 | 200～700 | 収穫14日前まで | 3回以内 | 6回以内（塗布は3回以内、散布は3回以内 | 散布 |
| びわ | ごま色斑点病 | 800 | 200～700 | 収穫14日前まで | 3回以内 | 7回以内（塗布は3回以内、散布は3回以内、灌注は1回以内） | 散布 |
| びわ | 灰斑病 | 800～1000 | 200～700 | 収穫14日前まで | 3回以内 | 7回以内（塗布は3回以内、散布は3回以内、灌注は1回以内） | 散布 |
| びわ | 白紋羽病 | 300～500 | — | 収穫後（7月上旬～9月上旬） | 1回 | 7回以内（塗布は3回以内、散布は3回以内、灌注は1回以内） | 灌注 |
| いちじく | 黒葉枯病 | 1000 | 200～700 | 収穫7日前まで | 5回以内 | 14回以内（塗布は3回以内、灌注は6回以内、散布は5回以内） | 散布 |
| いちじく | 黒かび病 そうか病 | 1000～1500 | 200～700 | 収穫7日前まで | 5回以内 | 14回以内（塗布は3回以内、灌注は6回以内、散布は5回以内） | 散布 |
| いちじく | 株枯病 | 500 | 1～10L/株 | 収穫前日まで | 6回以内 | 14回以内（塗布は3回以内、灌注は6回以内、散布は5回以内） | 灌注 |
| キウイフルーツ | 果実軟腐病 | 1000 | 200～700 | 収穫前日まで | 5回以内 | 8回以内（塗布は3回以内、散布は5回以内） | 散布 |
| りんご（苗木） なし（苗木） | 白紋羽病 | 500 | — | 植付前 | 1回 | 6回以内 | 10分間根部浸漬 |
| もも（苗木） | 白紋羽病 | 500 | — | 植付前 | 1回 | 7回以内（散布は6回以内） | 10分間根部浸漬 |
| オリーブ | 梢枯病 | 1000 | 200～700 | 収穫30日前まで | 2回以内 | 5回以内（塗布は3回以内、散布は2回以内） | 散布 |
| あけび（果実） | うどんこ病 | 1000 | 200～700 | 収穫7日前まで | 3回以内 | 3回以内 | 散布 |
| くり | 実炭疽病 | 1000 | 200～700 | 収穫3日前まで | 4回以内 | 7回以内（塗布は3回以内、散布は4回以内） | 散布 |
| 水稲 | ばか苗病 | 300～500 | — | は種前（浸種前又は浸種後） | 1回 | 3回以内（種子への処理は1回以内） | 6～24時間種子浸漬 |
| 水稲 | ばか苗病 | 30 | — | は種前（浸種前又は浸種後） | 1回 | 3回以内（種子への処理は1回以内） | 10分間種子浸漬 |
| 小麦 | 雪腐病 | 1000～2500 | 60～150 | 根雪前 | 3回以内（出穂期以降は2回以内） | 4回以内（種子への処理は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内 出穂期以降は2回以内） | 散布 |
| 小麦 | 雪腐大粒菌核病 | 1000 | 60～150 | 根雪前 | 3回以内（出穂期以降は2回以内） | 4回以内（種子への処理は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内 出穂期以降は2回以内） | 散布 |
| 小麦 | 雪腐大粒菌核病 | 250～500 | 25 | 根雪前 | 3回以内（出穂期以降は2回以内） | 4回以内（種子への処理は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内 出穂期以降は2回以内） | 散布 |
| 小麦 | 赤かび病 | 250 | 25 | 収穫14日前まで | 3回以内（出穂期以降は2回以内） | 4回以内（種子への処理は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内 出穂期以降は2回以内） | 散布 |
| 小麦 | 赤かび病 | 1000～1500 | 60～150 | 収穫14日前まで | 3回以内（出穂期以降は2回以内） | 4回以内（種子への処理は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内 出穂期以降は2回以内） | 散布 |
| 小麦 | うどんこ病 | 1000～2000 | 60～150 | 収穫14日前まで | 3回以内（出穂期以降は2回以内） | 4回以内（種子への処理は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内 出穂期以降は2回以内） | 散布 |
| 小麦 | 眼紋病 | 1000 | 60～150 | 収穫14日前まで | 3回以内（出穂期以降は2回以内） | 4回以内（種子への処理は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内 出穂期以降は2回以内） | 散布 |
| 麦類（小麦を除く） | 雪腐病 | 1000～2500 | 60～150 | 根雪前 | 3回以内（出穂期以降は1回以内） | 3回以内（種子への処理は1回以内、出穂期以降は1回以内） | 散布 |
| 麦類（小麦を除く） | 赤かび病 | 1000～1500 | 60～150 | 収穫30日前まで | 3回以内（出穂期以降は1回以内） | 3回以内（種子への処理は1回以内、出穂期以降は1回以内） | 散布 |
| 麦類（小麦を除く） | うどんこ病 | 1000～2000 | 60～150 | 収穫30日前まで | 3回以内（出穂期以降は1回以内） | 3回以内（種子への処理は1回以内、出穂期以降は1回以内） | 散布 |
| 麦類（小麦を除く） | 眼紋病 | 1000 | 60～150 | 収穫30日前まで | 3回以内（出穂期以降は1回以内） | 3回以内（種子への処理は1回以内、出穂期以降は1回以内） | 散布 |
| だいず | 紫斑病 | 種子重量の0.5% | — | は種前 | 1回 | 4回以内（種子への処理は1回以内） | 粉衣 |
| だいず | 紫斑病 | 700～1500 | 100～300 | 収穫14日前まで | 4回以内 | 4回以内（種子への処理は1回以内） | 散布 |
| だいず | 菌核病 | 700～1000 | 100～300 | 収穫14日前まで | 4回以内 | 4回以内（種子への処理は1回以内） | 散布 |
| あずき | 菌核病 | 700～1000 | 100～300 | 収穫14日前まで | 4回以内 | 5回以内（種子への処理は1回以内、は種後は4回以内） | 散布 |
| あずき | 輪紋病 炭疽病 | 700～1000 | 100～300 | 収穫14日前まで | 4回以内 | 5回以内（種子への処理は1回以内、は種後は4回以内） | 散布 |
| いんげんまめ | 菌核病 角斑病 苗立枯病 | 700～1000 | 100～300 | 収穫7日前まで | 4回以内 | 5回以内（種子への処理は1回以内、は種後は4回以内） | 散布 |
| いんげんまめ | 炭疽病 | 700～1500 | 100～300 | 収穫7日前まで | 4回以内 | 5回以内（種子への処理は1回以内、は種後は4回以内） | 散布 |
| えんどうまめ | 褐紋病 褐斑病 灰色かび病 | 1500～2000 | 100～300 | 収穫7日前まで | 4回以内 | 5回以内（種子への処理は1回以内、は種後は4回以内） | 散布 |
| 実えんどう さやえんどう | 褐紋病 褐斑病 灰色かび病 | 2000 | 100～300 | 収穫前日まで | 3回以内 | 4回以内（種子への処理は1回以内、は種後は3回以内） | 散布 |
| えだまめ | 菌核病 | 2000 | 100～300 | 収穫7日前まで | 3回以内 | 4回以内（種子への処理は1回以内、は種後は3回以内） | 散布 |
| らっかせい | 褐斑病 黒渋病 灰色かび病 | 1500～2000 | 100～300 | 収穫7日前まで | 4回以内 | 5回以内（種子への処理は1回以内、は種後は4回以内） | 散布 |
| らっかせい | 茎腐病 そうか病 | 1500 | 100～300 | 収穫7日前まで | 4回以内 | 5回以内（種子への処理は1回以内、は種後は4回以内） | 散布 |
| ばれいしょ | 菌核病 | 1000～1500 | 100～300 | 収穫7日前まで | 5回以内 | 5回以内（種いもへの処理は1回以内） | 散布 |
| やまのいも | 葉渋病 炭疽病 | 800 | 100～300 | 収穫7日前まで | 5回以内 | 5回以内 | 散布 |
| やまのいも（むかご） | 葉渋病 炭疽病 | 800 | 100～300 | 収穫45日前まで | 5回以内 | 5回以内 | 散布 |
| かんしょ | 基腐病 | 200～500 | — | 貯蔵前～伏せ込み前 | 1回 | 1回 | 30分間採苗用種いも浸漬 |
| かんしょ | 黒斑病 | 200～500 | — | 植付前 | 1回 | 1回 | 20～30分間種いも又は苗茎部浸漬 |
| さといも さといも（葉柄） | 黒斑病 | 200～500 | — | 植付前 | 1回 | 1回 | 20～30分間種いも浸漬 |
| キャベツ | 根朽病 株腐病 | 1000 | 100～300 | 収穫3日前まで | 2回以内 | 3回以内（種子への処理は1回以内、は種後は2回以内） | 散布 |
| キャベツ | 菌核病 | 1000～1500 | 100～300 | 収穫3日前まで | 2回以内 | 3回以内（種子への処理は1回以内、は種後は2回以内） | 散布 |
| はくさい | 菌核病 | 1500～2000 | 100～300 | 収穫7日前まで | 2回以内 | 3回以内（種子への処理は1回以内、は種後は2回以内） | 散布 |
| はくさい | 白斑病 炭疽病 | 1500 | 100～300 | 収穫7日前まで | 2回以内 | 3回以内（種子への処理は1回以内、は種後は2回以内） | 散布 |
| カリフラワー | 菌核病 | 2000 | 100～300 | 収穫前日まで | 2回以内 | 3回以内（種子への処理は1回以内、は種後は2回以内） | 散布 |
| ブロッコリー | 菌核病 | 2000 | 100～300 | 収穫14日前まで | 2回以内 | 3回以内（種子への処理は1回以内、は種後は2回以内） | 散布 |
| レタス | すそ枯病 | 1500 | 100～300 | 収穫7日前まで | 2回以内 | 4回以内（種子への処理は1回以内、灌注は1回以内、散布は2回以内） | 散布 |
| レタス | ビッグベイン病 菌核病 | 1500 | 1.5L/㎡ | 収穫45日前まで | 1回 | 4回以内（種子への処理は1回以内、灌注は1回以内、散布は2回以内） | 灌注 |
| レタス | 菌核病 灰色かび病 | 1500～2000 | 100～300 | 収穫7日前まで | 2回以内 | 4回以内（種子への処理は1回以内、灌注は1回以内、散布は2回以内） | 散布 |
| 非結球レタス | 菌核病 灰色かび病 | 1500～2000 | 100～300 | 収穫21日前まで | 2回以内 | 3回以内（種子への処理は1回以内、は種後は2回以内） | 散布 |
| きゅうり | 菌核病 黒星病 | 1500～2000 | 100～300 | 収穫前日まで | 5回以内 | 6回以内（種子への処理は1回以内、は種後は5回以内） | 散布 |
| きゅうり | 炭疽病 うどんこ病 灰色かび病、つる枯病 | 1500～2000 | 100～300 | 収穫前日まで | 5回以内 | 6回以内（種子への処理は1回以内、は種後は5回以内） | 散布 |
| うり類(漬物用) | 炭疽病 うどんこ病 灰色かび病、つる枯病 | 1500～2000 | 100～300 | 収穫前日まで | 5回以内 | 6回以内（種子への処理は1回以内、は種後は5回以内） | 散布 |
| すいか | 菌核病 炭疽病 | 1500～2000 | 100～300 | 収穫前日まで | 5回以内 | 6回以内（種子への処理は1回以内、は種後は5回以内） | 散布 |
| にがうり | 炭疽病 斑点病 | 1500～2000 | 100～300 | 収穫前日まで | 5回以内 | 6回以内（種子への処理は1回以内、は種後は5回以内） | 散布 |
| かぼちゃ | 白斑病 | 1000 | 100～300 | 収穫前日まで | 5回以内 | 6回以内（種子への処理は1回以内、は種後は5回以内） | 散布 |
| トマト ミニトマト | 葉かび病 灰色かび病 菌核病 | 1500～2000 | 100～300 | 収穫前日まで | 5回以内 | 6回以内（種子への処理は1回以内、は種後は5回以内） | 散布 |
| なす | 灰色かび病 黒枯病 菌核病 | 1500～2000 | 100～300 | 収穫前日まで | 5回以内 | 6回以内（種子への処理は1回以内、は種後は5回以内） | 散布 |
| メロン | つる枯病 陥没病 | 1500～2000 | 100～300 | 収穫前日まで | 3回以内 | 5回以内（種子への処理は1回以内、塗布は1回以内、散布は3回以内） | 散布 |
| オクラ | 葉すす病 | 1500 | 100～300 | 収穫前日まで | 3回以内 | 5回以内（種子への処理は1回以内、塗布は1回以内、散布は3回以内） | 散布 |
| いちご | うどんこ病 | 1500 | 100～300 | 収穫開始21日前まで | 3回以内 | 4回以内（種子への処理は1回以内、は種後は3回以内） | 散布 |
| いちご | うどんこ病 | 1000 | — | 株冷蔵栽培の株冷蔵前 | 3回以内 | 4回以内（種子への処理は1回以内、は種後は3回以内） | 5分間株浸漬 |
| いちご | 萎黄病 | 300～500 | — | 仮植前 | 3回以内 | 4回以内（種子への処理は1回以内、は種後は3回以内） | 1時間苗根部浸漬 |
| いちご | 萎黄病 | 300～500 | 3L/㎡ | 仮植時及び仮植栽培期 | 3回以内 | 4回以内（種子への処理は1回以内、は種後は3回以内） | 灌注 |
| アスパラガス | 茎枯病 立枯病 | 1000 | 100～300 | 収穫開始7日前まで | 5回以内 | 6回以内（種子への処理は1回以内、は種後は5回以内） | 散布 |
| せり | 葉枯病 | 1500 | 100～300 | 収穫14日前まで | 2回以内 | 3回以内（種子への処理は1回以内、は種後は2回以内） | 散布 |
| ねぎ | 小菌核腐敗病 | 1000 | 100～300 | 収穫7日前まで | 3回以内 | 5回以内（種子への処理は1回以内、苗根部浸漬及び苗床灌注は合計1回以内、散布及び株元散布は合計3回以内） | 散布 |
| ねぎ | 小菌核腐敗病 | 250 | チェーンポット1冊（30×60cm、土壌約5L）当り0.5～1L | 定植直前 | 1回 | 5回以内（種子への処理は1回以内、苗根部浸漬及び苗床灌注は合計1回以内、散布及び株元散布は合計3回以内） | 苗床灌注 |
| ねぎ | 萎凋病 小菌核腐敗病 | 20 | — | 定植直前 | 1回 | 5回以内（種子への処理は1回以内、苗根部浸漬及び苗床灌注は合計1回以内、散布及び株元散布は合計3回以内） | 3分間苗根部浸漬 |
| ねぎ | 萎凋病 小菌核腐敗病 | 200 | — | 定植直前 | 1回 | 5回以内（種子への処理は1回以内、苗根部浸漬及び苗床灌注は合計1回以内、散布及び株元散布は合計3回以内） | 30分間苗根部浸漬 |
| たまねぎ | 小菌核病 | 500～1000 | 100～300 | 収穫前日まで | 6回以内（但し定植後は5回以内） | 7回以内（種子への処理は1回以内、苗根部浸漬は1回以内、無人航空機散布は3回以内、散布は5回以内） | 散布 |
| たまねぎ | 灰色腐敗病 | 500～1000 | 100～300 | 収穫前日まで | 6回以内（但し定植後は5回以内） | 7回以内（種子への処理は1回以内、苗根部浸漬は1回以内、無人航空機散布は3回以内、散布は5回以内） | 散布 |
| たまねぎ | 灰色腐敗病 | 500 | — | 定植直前 | 6回以内（但し定植後は5回以内） | 7回以内（種子への処理は1回以内、苗根部浸漬は1回以内、無人航空機散布は3回以内、散布は5回以内） | 5分間苗根部浸漬 |
| 葉たまねぎ | 黒点葉枯病 | 1000 | 100～300 | 収穫14日前まで | 3回以内 | 4回以内（種子への処理は1回以内、は種後は3回以内） | 散布 |
| 甘草 | 株枯病 | 200 | — | 植付前 | 1回 | 1回 | 30分間苗浸漬 |
| しょうが | いもち病 白星病 | 1000 | 100～300 | 収穫7日前まで | 2回以内 | 2回以内 | |
| らっきょう | 乾腐病 | 1000 | 700ml/㎡ | 収穫7日前まで | 3回以内 | 3回以内 | 株元灌注 |
| 食用ぎく | 褐斑病 | 1500 | 100～300 | 収穫28日前まで | 2回以内 | 3回以内（種子への処理は1回以内、は種後は2回以内） | 散布 |
| にら | 白斑葉枯病 乾腐病 | 1000 | 3L/㎡ | 収穫21日前まで | 1回 | 2回以内（種子への処理は1回以内、は種後は1回以内） | 灌注 |
| 食用ゆり | 鱗茎さび症 | 50 | — | 植付前 | 1回 | 1回 | 球根瞬間浸漬 |
| たらのき | 芽枯症 | 2000 | 0.1～0.3L/㎡ | 伏せ込み後萌芽前 但し収穫21日前まで | 1回 | 3回以内（伏せ込み前は2回以内、伏せ込み後は1回以内） | 駒木散布 |
| たらのき | そうか病 | 1500 | 200～700 | 伏せ込み前 但し、収穫60日前まで | 2回以内 | 3回以内（伏せ込み前は2回以内、伏せ込み後は1回以内） | 散布 |
| ズッキーニ | うどんこ病 | 1500 | 100～300 | 収穫前日まで | 3回以内 | 4回以内（種子への処理は1回以内、は種後は3回以内） | 散布 |
| ピーマン | 黒枯病 | 4000～6000 | 100～300 | 収穫前日まで | 3回以内 | 4回以内（種子への処理は1回以内、は種後は3回以内） | 散布 |
| ししとう | 黒枯病 | 10000 | 100～300 | 収穫前日まで | 3回以内 | 3回以内 | 散布 |
| セルリー | 斑点病 | 1500 | 100～300 | 収穫60日前まで | 2回以内 | 3回以内（種子への処理は1回以内、は種後は2回以内） | 散布 |
| みつば | 菌核病 | 2000 | 100～300 | 収穫14日前まで 但し、伏せ込み栽培は伏せ込み前まで | 2回以内 | 3回以内（種子への処理は1回以内、は種後は2回以内） | 散布 |
| 食用べにばな（花） | 炭疽病 | 1500 | 100～300 | 収穫14日前まで | 2回以内 | 3回以内（種子への処理は1回以内、は種後は2回以内） | 散布 |
| みしまさいこ | 炭疽病 | 1000 | 100～300 | 収穫30日前まで | 2回以内 | 3回以内（種子への処理は1回以内、は種後は2回以内） | 散布 |
| なたね | 菌核病 | 1000 | 100～300 | 収穫21日前まで | 3回以内（開花後は2回以内 | 3回以内（開花後は2回以内） | 散布 |
| なたね | 雪腐菌核病 | 1000 | 100～300 | 根雪前 | 3回以内（開花後は2回以内 | 3回以内（開花後は2回以内） | 散布 |
| 茶 | 炭疽病 白星病 褐色円星病 輪斑病 | 1500～2000 | 200～400 | 摘採7日前まで | 1回 | 1回 | 散布 |
| 茶 | 黒葉腐病 | 1500 | 200～400 | 摘採7日前まで | 1回 | 1回 | 散布 |
| れんこん | 褐斑病 | 1500 | 100～300 | 収穫前日まで | 3回以内 | 3回以内 | 散布 |
| てんさい | 褐斑病 | 2000～3000 | 100～300 | 収穫7日前まで | 5回以内 | 5回以内 | 散布 |
| 桑 | 裏うどんこ病 汚葉病 | 1000～2000 | 100～300 | — | 3回以内 | 3回以内 | 散布 |
| 桑 | 輪斑病 | 1000～1500 | 100～300 | — | 3回以内 | 3回以内 | 散布 |
| 桑（苗木） | 白紋羽病 | 500 | — | 植付前 | 1回 | 3回以内 | 10分間根部浸漬 |
| まめ科牧草 | 菌核病 | 2000 | 100～300 | 根雪前 | 1回 | 1回 | 散布 |
| いね科牧草 | 雪腐大粒菌核病 | 1500～2000 | 100～300 | 根雪前 | 2回以内 | 2回以内 | 散布 |
| べにばな | 炭疽病 | 1500 | 100～300 | — | 2回以内 | 5回以内 | 散布 |
| ばら | 黒星病 うどんこ病 | 1500～2000 | 100～300 | — | 5回以内 | 5回以内 | 散布 |
| シクラメン | 灰色かび病 | 1500～2000 | 100～300 | — | 5回以内 | 5回以内 | 散布 |
| さくらそう | 灰色かび病 | 1500～2000 | 100～300 | — | 5回以内 | 5回以内 | 散布 |
| ゆり | 葉枯病 茎腐病 | 1500～2000 | 100～300 | — | 5回以内 | 5回以内 | 散布 |
| きく | 褐斑病 | 1500～2000 | 100～300 | — | 5回以内 | 5回以内 | 散布 |
| カーネーション | 芽腐病 | 1500～2000 | 100～300 | — | 5回以内 | 5回以内 | 散布 |
| けいとう | 茎腐病 輪紋病 | 1500～2000 | 100～300 | — | 5回以内 | 5回以内 | 散布 |
| ほおずき きんせんか | 半身萎凋病 | 1500～2000 | 100～300 | — | 5回以内 | 5回以内 | 散布 |
| りんどう | 花腐菌核病 | 1500 | 100～300 | — | 5回以内 | 5回以内 | 散布 |
| 観賞用アスパラガス | 茎枯病 | 500～1000 | 100～300 | — | 5回以内 | 5回以内 | 散布 |
| 花き類・観葉植物（トルコギキョウを除く） | 菌核病 | 1500 | 100～300 | — | 5回以内 | 5回以内 | 散布 |
| トルコギキョウ | 菌核病 | 1500 | 100～300 | — | 5回以内 | 5回以内 | 散布 |
| トルコギキョウ | 斑点病 | 1500 | 100～300 | — | 5回以内 | 5回以内 | 散布 |
| 樹木類（つつじ類、かし、さくら、じんちょうげ、ぼけ、ポプラ、いぬつげを除く） | 炭疽病 | 1000～2000 | 200～700 | 発病初期 | 5回以内 | 5回以内 | 散布 |
| 樹木類（つつじ類、かし、さくら、じんちょうげ、ぼけ、ポプラ、いぬつげを除く） | うどんこ病 ごま色斑点病 輪紋葉枯病 斑点症（シュードサーコスポラ菌） | 1000 | 200～700 | 発病初期 | 5回以内 | 5回以内 | 散布 |
| つつじ類 | 褐斑病 | 1000～1500 | 100～300 | 発病初期 | 5回以内 | 5回以内 | 散布 |
| つつじ類 | 炭疽病 | 1000～2000 | 100～300 | 発病初期 | 5回以内 | 5回以内 | 散布 |
| つつじ類 | うどんこ病 ごま色斑点病 輪紋葉枯病 斑点症（シュードサーコスポラ菌） | 1000 | 100～300 | 発病初期 | 5回以内 | 5回以内 | 散布 |
| さくら | 幼果菌核病 | 1000～1500 | 200～700 | 発病初期 | 5回以内 | 5回以内 | 散布 |
| さくら | 炭疽病 | 1000～2000 | 200～700 | 発病初期 | 5回以内 | 5回以内 | 散布 |
| さくら | うどんこ病 ごま色斑点病 輪紋葉枯病 斑点症（シュードサーコスポラ菌） | 1000 | 200～700 | 発病初期 | 5回以内 | 5回以内 | 散布 |
| かし | 炭疽病 | 1000～2000 | 200～700 | 発病初期 | 5回以内 | 5回以内 | 散布 |
| かし | 紫かび病 うどんこ病 ごま色斑点病 輪紋葉枯病 斑点症（シュードサーコスポラ菌） | 1000 | 200～700 | 発病初期 | 5回以内 | 5回以内 | 散布 |
| じんちょうげ | 炭疽病 | 1000～2000 | 100～300 | 発病初期 | 5回以内 | 5回以内 | 散布 |
| じんちょうげ | 黒点病 うどんこ病 ごま色斑点病 輪紋葉枯病 斑点症（シュードサーコスポラ菌） | 1000 | 100～300 | 発病初期 | 5回以内 | 5回以内 | 散布 |
| ぼけ | 炭疽病 | 1000～2000 | 100～300 | 発病初期 | 5回以内 | 5回以内 | 散布 |
| ぼけ | 褐斑病 うどんこ病 ごま色斑点病 輪紋葉枯病 斑点症（シュードサーコスポラ菌） | 1000 | 100～300 | 発病初期 | 5回以内 | 5回以内 | 散布 |
| ポプラ | 炭疽病 | 1000～2000 | 200～700 | 発病初期 | 5回以内 | 5回以内 | 散布 |
| ポプラ | マルゾニナ落葉病 うどんこ病 ごま色斑点病 輪紋葉枯病 斑点症（シュードサーコスポラ菌） | 1000 | 200～700 | 発病初期 | 5回以内 | 5回以内 | 散布 |
| いぬつげ | 炭疽病 | 1000～2000 | 200～700 | 発病初期 | 5回以内 | 5回以内 | 散布 |
| いぬつげ | うどんこ病 ごま色斑点病 輪紋葉枯病 斑点症（シュードサーコスポラ菌） 枝枯病 | 1000 | 200～700 | 発病初期 | 5回以内 | 5回以内 | 散布 |
| チューリップ | 球根腐敗病 | 球根重量の0.1% | — | 植付前又は貯蔵前 | 1回 | 5回以内 | 球根粉衣 |
| たばこ（苗床） | 腰折病 | 1000～2000 | 2L/㎡ | 苗床期 | 2回以内 | 2回以内 | 散布 |
| たばこ（苗床） | 黒根病 | 1000 | 2L/㎡ | 苗床期 | 2回以内 | 2回以内 | 散布 |