パスアスゴ殺菌剤

作物名	適用病害虫名・雑草名	使用量	本剤の使用回数	使用時期	使用方法	ダゾメット含む薬剤の総使用回数
キャベツ	菌核病(リゾクトニア菌) 黒腐病 根こぶ病 バーティシリウム萎凋病 ネコブセンチュウ 一年生雑草	20～30kg/10a	1回	は種又は定植21日前まで	本剤の所定量を均一に散布して土壌に混和する。	1回
非結球メキャベツ	茎腐病 一年生雑草			定植21日前まで		
はくさい	根こぶ病 ネコブセンチュウ 炭疽病 根くびれ病 白斑病 一年生雑草			は種又は定植21日前まで		
だいこん	ネグサレセンチュウ	10～20kg/10a		は種21日前まで		
かぶ	根こぶ病 茎腐病 バーティシリウム萎凋病 一年生雑草	20～30kg/10a		は種又は定植21日前まで		
非結球あぶらな科葉菜類(非結球メキャベツ、すぐき、非結球はくさい、なばな類、キングンサイ、メイプルほか除く)	根こぶ病	30kg/10a		は種14日前まで		
	一年生雑草	20～30kg/10a				
こまつな	茎腐病 根こぶ病 一年生雑草			は種14日前まで		
非結球はくさい				は種又は定植14日前まで		
ブロッコリー カリフラワー	テンサイシストセンチュウ	30kg/10a		は種又は定植21日前まで		
なばな類	根こぶ病 一年生雑草	20～30kg/10a				
		20kg/10a				
キングンサイ						
みずな	菌核病(ビクトル菌) 根こぶ病 一年生雑草	30kg/10a		は種14日前まで		
ほうれんそう	一年生雑草	20kg/10a		は種14日前まで		
きゅうり	菌立枯病(ビクトル菌) 菌立枯病(リゾクトニア菌)	200～400kg/ m^2		は種又は定植21日前まで	土壌に本剤の所定量を加え十分混和する。	
かぼちゃ	つる枯病 半身萎凋病 白絹病 一年生雑草	20～30kg/10a			本剤の所定量を均一に散布して土壌に混和する。	
メロン	つるドロンタム枯病 菌立枯病(リゾクトニア菌) 一年生雑草					
	黒点根腐病 つる枯病 半身萎凋病 黒斑根腐症 白絹病 一年生雑草					
	紅色根腐病	30kg/10a				
すいか	菌立枯病(リゾクトニア菌)	200～400kg/ m^2			土壌に本剤の所定量を加え十分混和する。	
	つる枯病 白絹病 一年生雑草	20～30kg/10a			本剤の所定量を均一に散布して土壌に混和する。	
にがうり	つる枯病 ネコブセンチュウ 一年生雑草					
	菌立枯病(リゾクトニア菌)	200～300kg/ m^2			土壌に本剤の所定量を加え十分混和する。	
トマト ミニトマト	半身萎凋病 褐色根腐病 根腐萎凋病 黒点病 白絹病 ネコブセンチュウ 一年生雑草	20～30kg/10a			本剤の所定量を均一に散布して土壌に混和する。	
	紅色根腐病	30kg/10a				
なす	青枯病	30～60kg/10a				
		30kg/10a				
	菌立枯病(リゾクトニア菌) 半身萎凋病 白絹病 ネコブセンチュウ 一年生雑草	20～30kg/10a				
ピーマン	菌立枯病(リゾクトニア菌) 葉斑病 半身萎凋病 青枯病 白絹病 一年生雑草	30kg/10a				
ばれいしょ	そうか病 粉状そうか病 黒あざ病 疫病 一年生雑草	20～30kg/10a		植付21日前まで		
とうがらし類	菌立枯病(リゾクトニア菌) 疫病 炭疽病 青枯病 一年生雑草	30kg/10a		定植21日前まで	本剤の所定量を均一に散布して土壌に混和する。	
ねぎ	黒斑葉枯病	30～60kg/10a		は種又は定植14日前まで		
	紅色根腐病 ネギハモグリバエ	30kg/10a				
	白絹病 小菌核腐敗病 黒斑病 根腐萎凋病 ネコブセンチュウ 菌立枯病(リゾクトニア菌) 一年生雑草	20～30kg/10a				
わけぎ	菌立枯病(リゾクトニア菌) 一年生雑草	20～30kg/10a				
たまねぎ	黒斑葉枯病	30～60kg/10a		は種又は定植21日前まで		
	紅色根腐病	30kg/10a				
	軟腐病 白絹病 ネコブセンチュウ 一年生雑草	20～30kg/10a				
	菌立枯病	20～40kg/10a				
	黒斑病 一年生雑草	20～30kg/10a		収穫(翌春は種)		
	べと病	20kg/10a		は種14日前まで	本剤の所定量を均一に散布し浅く混和する。	
葉たまねぎ(葉菜)	一年生雑草	10～20kg/10a				
にんにく	イモグサレセンチュウ 紅色根腐病 白絹病 一年生雑草	30kg/10a		植付28日前まで		
らっきょう	根腐病 ネコブセンチュウ 軟腐病 一年生雑草			植付21日前まで		
にら	紅色根腐病 軟腐病 白絹病 一年生雑草					
		30～60kg/10a				
にんにく	黒斑病 根腐病 しん腐病 軟腐病 白絹病 ネコブセンチュウ 一年生雑草	20～30kg/10a		は種又は定植21日前まで		
パセリ	疫病 葉斑病 菌立枯病(リゾクトニア菌) 一年生雑草	30kg/10a				
セルリー	葉斑病 一年生雑草					
あしたば	菌立枯病(リゾクトニア菌) 一年生雑草	20kg/10a		は種10日前まで		
しゅんぎく	葉斑病 一年生雑草			は種21日前まで		
ごぼう 茎ごぼう	葉斑病 黒あざ病 一年生雑草	20～30kg/10a		は種21日前まで		
もりあざみ	半身萎凋病 黒あざ病 一年生雑草	30kg/10a		は種21日前まで		
レタス	コルキーロット病 菌核病 ネグサレセンチュウ			は種又は定植14日前まで		
非結球レタス	すそ枯病 菌核病 一年生雑草	20～30kg/10a				
食用ぎく	すそ枯病 根腐病 茎腐病 黒斑病 白絹病 一年生雑草			は種又は定植21日前まで	本剤の所定量を均一に散布して土壌に混和する。	
	センチュウ類 (バテレンセンチュウを除く) 根腐病 茎腐病 白絹病 一年生雑草					
ふき	半身萎凋病 白絹病 一年生雑草	30kg/10a				
みつば	立枯病 一年生雑草	20kg/10a		は種21日前まで		
豆類(未成熟、若いさや、未成熟豆、さやいんげん、さやえんどう、未成熟そらまめを除く)	菌核病(リゾクトニア菌) 茎腐病 一年生雑草	30kg/10a				
さやいんげん	菌核病(リゾクトニア菌) 茎腐病 一年生雑草	20～30kg/10a		は種又は定植21日前まで		
えだまめ						
未成熟そらまめ	ダイズシストセンチュウ	30kg/10a		は種又は定植40日前まで		
	菌核病(リゾクトニア菌) 茎腐病 えそモザイク病 一年生雑草					
さやえんどう 実えんどう	菌核病(リゾクトニア菌) 茎腐病 一年生雑草	20～30kg/10a		は種又は定植21日前まで		
かんしょ	蔓枯病 つる枯病 白絹病 ネコブセンチュウ 一年生雑草			植付21日前まで		
	基腐病	30kg/10a				
こんにゃく	白絹病 軟腐病	20～30kg/10a				
	根腐病 一年生雑草	20～40kg/10a				
さといも さといも(茎葉用)	軟腐病 一年生雑草	20～30kg/10a				
	ネグサレセンチュウ					
しょうが 葉しょうが	根腐腐敗病	30～60kg/10a		定植21日前まで		
	一年生雑草	20～30kg/10a				
みょうが(花蓮) みょうが(茎蓮)	立枯症 一年生雑草	30kg/10a		定植42日前まで		
いちご	葉腐病 炭そ病 黒点病 軟腐病 一年生雑草	20～30kg/10a		仮植又は定植21日前まで		
	青枯病 疫病	30kg/10a				
ほうれんそう	ホウレンソウケナガコナダニ	10kg/10a		は種14日前まで	本剤の所定量を均一に散布し深く混和する。	
	茎腐病 軟腐病 立枯病 根腐病 一年生雑草	20～30kg/10a			本剤の所定量を均一に散布して土壌に混和する。	
てんさい	葉根病 菌立枯病	1ml当り 200～400g		秋播(翌春は種)		
やまのいも	褐色腐敗病 軟腐病	20～30kg/10a		植付21日前まで		
やまのいも(むかご)				定植21日前まで		
つるむらさき	ネコブセンチュウ 一年生雑草			定植21日前まで		
しそ	青枯病 一年生雑草	30kg/10a		は種又は定植14日前まで		
モロヘイヤ	ネコブセンチュウ 一年生雑草			定植30日前まで		
チャービル	一年生雑草	20kg/10a		は種21日前まで		
たばこ	野火病 角斑病 センチュウ類	10～20kg/10a		秋期(翌春植付)		
	立枯病 疫病 葉枯病 一年生雑草	30kg/10a				
	疫病 センチュウ類	5～10kg/10a		春期(植付前)	本剤の所定量を均一に散布して土壌とかき混和する。	
いぐさ	一年生雑草	30kg/10a		収穫直後の定植2週間前まで(入水1日前まで)	本剤の所定量を均一に散布して土壌に混和する。	
花き類・観葉植物	一年生雑草	20～60kg/10a		は種又は植付前	本剤の所定量を均一に散布して土壌に混和する。	
	菌立枯病(リゾクトニア菌) 球根腐敗病 半身萎凋病 疫病 白絹病 軟腐病 葉斑病 葉病 立枯病 根腐かびムシ病 ネコブセンチュウ	20～30kg/10a				
	青枯病	30kg/10a				
せんりょう	立枯病 一年生雑草	20～30kg/10a		植付前	本剤の所定量を均一に散布して土壌に混和する。	
つつじ類	センチュウ類 一年生雑草					
樹木類(苗木)	一年生雑草			植付前		
カーネーション	萎凋細菌病					
きく	センチュウ類 (バテレンセンチュウを除く)			は種又は植付前		
	茎腐病					
スック	葉腐病	30～60kg/10a		植付前		
ほたんしゃくやく	根腐病					
スターチス	葉斑細菌病	20～30kg/10a		は種又は植付前		
グロリオサ	紅色根腐病					
スイセン	腐敗病					
さくらそう	軟腐病					
トルコギキョウ ハンブーン	根 腐 病					
アイスランドポピー	萎 縮 病					
りんご	黒星病 白紋羽病	50～100g/ m^2		夏期～秋期	被覆資材敷に本剤の所定量を均一に散布して土壌とかき混和する。	
なし		100g/ m^2		被覆発生前	土壌に本剤の所定量を加え十分混和する。	
ぶどう		50～100g/ m^2				
茶	一年生雑草	苗土用土10kg当り 100～200g		定植前	被覆資材敷に本剤の所定量を均一に散布して土壌とかき混和する。	
		30kg/10a		夏期～秋期	被覆資材敷に本剤の所定量を均一に散布して土壌とかき混和する。	
桑	黒紋羽病 白紋羽病	1株当り4ml 400～600g				

作物名	使用目的	使用量	本剤の使用回数	使用時期	使用方法	本剤および ダゾメット含む薬剤の総使用回数
樹木類	定植堀場の 無根病菌類、なんたん病菌、ならたけ之寿菌の密度低減	100g/ m^2	1回	定植前	被覆資材敷に本剤の所定量を均一に散布して土壌とかき混和する	1回