

## フルピカフロアブル

作物名	適用病害名	希釈倍数 (倍)	散布液量 (L/10a)	使用時期	使用方法	本剤及びメパニピ リムを含む農薬の 総使用回数												
かんきつ	灰色かび病	2000～3000	200～700	開花期～幼果期 (但し、収穫90日 前まで)	散布	2回以内												
りんご	黒星病	2000～6000		2000		収穫21日前まで	5回以内											
	斑点落葉病	2000～4000																
	うどんこ病 モニリア病	2000																
なし	黒星病																	
もも	灰星病 黒星病	2000～3000		100～300		収穫前日まで		2回以内										
ぶどう	灰色かび病 うどんこ病					収穫30日 前まで												
かき	灰色かび病 うどんこ病	2000～3000		100～300		収穫14日前まで		5回以内										
びわ	灰色かび病	2000		100～300		収穫7日前まで		3回以内										
マンゴー						収穫14日前まで												
あずき		2000		100～300		収穫14日前まで		5回以内										
いんげんまめ		2000～3000		100～300		収穫14日前まで		5回以内										
ねぎ	小菌核腐敗病	2000	100～300	収穫7日前まで	4回以内													
きゅうり	うどんこ病	67	10	収穫前日まで		常温煙霧												
	褐斑病	2000～3000	100～300			散布												
	灰色かび病																	
すいか メロン かぼちゃ	うどんこ病	2000～3000	100～300				収穫前日まで	散布										
トマト ミニトマト	灰色かび病	67	10						常温煙霧									
なす	うどんこ病									67	10							
	灰色かび病	2000～3000	100～300							散布								
ピーマン	うどんこ病	2000									100～300	収穫7日前まで	3回以内					
パセリ	うどんこ病	3000	2000～3000										収穫前日まで	2回以内				
いちご	灰色かび病	2000～3000												50	5	常温煙霧		
	うどんこ病																100	10
	ラズベリー				2000												200～700	発病初期
花き類・観葉植物 (ばら、スターチ ス、宿根かすみ そう、ゆり、りんど うを除く)	2000～3000	2000		200～700	5回以内													
ばら						灰色かび病 黒星病 うどんこ病												
ゆり	葉枯病 灰色かび病					2000								2000	3回以内			
スターチス 宿根かすみそう	灰色かび病 うどんこ病																	
りんどう	灰色かび病					2000～3000	2000	200～700	3回以内									
	黒斑病 褐斑病																	
樹木類 (かしを除く)	うどんこ病 灰色かび病					2000	2000	200～700	3回以内									
かし	うどんこ病 灰色かび病 紫かび病																	