

作物名	適用病害虫名	希釈倍数 (倍)	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	フルアジナム を含む農薬の 総使用回数				
かんきつ	そうか病 灰色かび病 ミカンサビダニ	1000～2000	200～700L/10a	収穫30日前まで	1回	散布	2回以内 (散布は1回以内、 土壌灌注は1回以内)				
	苗疫病 黒点病 ミカンハダニ	1000									
りんご	斑点落葉病 黒星病 輪紋病	1000～2000		収穫45日前まで							
	すす点病 すす斑病 褐斑病	2000									
もも	灰星病 黒星病 ホモブシス腐敗病	2000		収穫7日前まで							
なし	黒斑病 黒星病 輪紋病	1000～2000		収穫30日前まで							
うめ	黒星病	2000		発芽期まで 但し、 収穫60日前まで							
ぶどう	晩腐病 べと病 枝膨病 灰色かび病	2000		開花直前～ 落弁期 但し、 収穫60日前まで							
	黒とう病	2000		休眠期							
		250									
キウイフルーツ	灰色かび病 果実軟腐病	1000～2000	収穫30日前まで								
パイナップル	心腐病	1000	-	植付前		20分間苗浸漬	1回				
小麦	紅色雪腐病 雪腐小粒菌核病 雪腐大粒菌核病	1000	60～150L/10a	根雪前	2回以内	散布	3回以内 (は種前は1回以内、 は種後は2回以内)				
	雪腐小粒菌核病	250	25L/10a								
ばれいしょ	菌核病	1000～2000	100～300L/10a	収穫14日前まで	4回以内		6回以内 (種いも浸漬は1回以内、 植付前の土壌混和及び 植付時の植溝散布合計は 1回以内、 植付後の散布は 4回以内)				
	疫病	1000～2000									
		500	25L/10a								
		800	40L/10a								
	夏疫病	2000	100～300L/10a								
そうか病	100	-	植付前	1回	種いも瞬間浸漬						
やまのいも	葉渋病	2000	100～300L/10a	収穫7日前まで	4回以内		散布	5回以内 (植付前の土壌混和は 1回以内、植付後の散布は 4回以内)			
やまのいも(むかご)								4回以内			
あずき	炭疽病 灰色かび病	1000～2000		1000	収穫21日前まで	3回以内		散布	3回以内		
	菌核病 輪紋病	1000									
いんげんまめ	炭疽病 灰色かび病	1000～2000		1000	収穫14日前まで						
	菌核病	1000									
べにばないんげん	灰色かび病	1000			収穫21日前まで						
ごぼう	黒条病	1000			収穫14日前まで						
にんじん	黒葉枯病	1000			収穫14日前まで						
たまねぎ	灰色腐敗病 べと病	1000～2000		1000～2000	収穫7日前まで					5回以内	散布
	灰色かび病	500	25L/10a								
		白色疫病	1000				100～300L/10a				
	乾腐病	50	-			定植直前	1回	5分間苗根部浸漬			
らっきょう	灰色かび病	2000	1000	収穫14日前まで	5回以内	散布	5回以内				
	白色疫病	1000									
アスパラガス (露地栽培)	茎枯病 斑点病	1000～2000	100～300L/10a	収穫終了後 但し、秋期まで							
てんさい	根腐病	1000～2000	1000	収穫30日前まで	4回以内	株元散布	5回以内 (は種前の土壌混和及び 苗床灌注は合計1回以内、 株元散布及び散布は 合計4回以内)				
	黒根病	1000									
		黒根病	100	3L/m ²	移植前	1回		苗床土壌灌注			
食用ゆり	葉枯病	1000～2000	100～300L/10a	収穫14日前まで	6回以内	散布	8回以内 (球根瞬間浸漬は2回以内、 散布は6回以内)				
	鱗茎さび症	50～200	-	植付前	2回以内	球根瞬間浸漬					
茶	炭疽病 輪斑病 網もち病 新梢枯死症 (輪斑病菌による) 灰色かび病	2000	200～400L/10a	摘採14日前まで	1回	散布	1回				
たばこ	菌核病	1000	100～200ml/株	大土寄期まで		株元灌注					
チューリップ	灰色かび病 褐色斑点病	2000～4000	100～300L/10a	発病初期	7回以内	散布	7回以内				
	球根腐敗病 皮膚病	100～200	-	植付前	1回	15分間球根浸漬					
ゆり	葉枯病	2000	100～300L/10a	発病初期	3回以内	散布	3回以内				
	鱗茎さび症	100～200	-	植付前	1回	球根瞬間浸漬					