

ペンコゼブフロアブル

作物名	適用病害名	希釈倍数	散布液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	マンゼブを含む農薬の総使用回数
ぶどう	晩腐病 黒とう病 べと病 褐斑病	1000倍	200～ 700L/10a	収穫45日 前まで	2回以内	散布	2回以内
うめ	黒星病 かきよう病 すす斑病			収穫21日 前まで	3回以内		3回以内
きゅうり	炭疽病 べと病	500～1000倍	150～ 300L/10a	収穫前日 まで			
	褐斑病	500倍					
トマト ミニトマト	疫病 葉かび病 輪紋病 すすかび病	1000倍					
メロン	べと病	500～600倍		収穫7日 前まで	5回以内		5回以内
	つる枯病	500倍			7回以内		7回以内
すいか	つる枯病 炭疽病	600倍		収穫30日 前まで	3回以内		3回以内
キャベツ	べと病						
ねぎ	黒斑病 さび病 べと病	500～600倍		収穫14日 前まで			
さやえんどう	褐紋病 褐斑病	500倍		100～ 300L/10a	収穫開始30 日前まで	2回以内	2回以内
実えんどう			収穫14日 前まで				
きく	白さび病	800倍	発病前～ 発病初期		8回以内	8回以内	