ポリオキシン AL 水溶剤「科研」

作物名	適用病害虫名	希釈倍数（倍）	使用駆量（L/10a）	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ポリオキシンを含む農薬の総使用回数
ぶどう	灰色かび病 黒とう病 うどんこ病 ハダニ類 チャノキイロアザミウマ	5000	200～700	収穫60日前まで	5回以内	散布	5回以内
マンゴー	灰色かび病 チャノキイロアザミウマ			収穫前日まで	3回以内		3回以内
きゅうり	灰色かび病 うどんこ病 ハダニ類 アザミウマ類		100～300	収穫前日まで	2回以内		2回以内
トマト	灰色かび病 葉かび病 アザミウマ類				3回以内		3回以内
なす	灰色かび病 すすかび病 うどんこ病 ハダニ類 アザミウマ類						
かぼちゃ	うどんこ病 つる枯病	2500		収穫7日前まで			
いちご	灰色かび病 うどんこ病 ハダニ類 アザミウマ類	5000		収穫開始 14日前まで			
メロン	つる枯病	10～50	―	収穫7日前まで	1回	塗布	5回以内 （塗布は1回以内）
	うどんこ病	1000～2000	100～300	収穫前日まで	5回以内	散布	
	ハダニ類 アザミウマ類	2000					
すいか	うどんこ病 つる枯病	1000～2000		収穫3日前まで			5回以内
	ハダニ類 アザミウマ類	2000					
はくさい	黒斑病	2500～5000		収穫7日前まで			
レタス 非結球レタス	菌核病	2500		収穫14日前まで	3回以内		3回以内
キャベツ	黒すす病	20	―	は種前	1回	10分間種子浸漬	7回以内(種子浸漬は1回以内、1000倍希釈,灌注は1回以内、2500倍希釈灌注は2回以内、散布は3回以内)
		1000	3L/㎡ セル成型育苗トレイ（30x60cm、土壌量約3～4L）1箱当り500ml	は種覆土後		灌注	
		2500	3L/㎡ セル成型育苗トレイ（30x60cm、土壌量約3～4L）1箱当り500ml	子葉展開期以降	2回以内		
	菌核病	1500	100～300	収穫14日前まで	3回以内	散布	
パセリ	うどんこ病	2500		収穫7日前まで	2回以内		2回以内
にら	白斑葉枯病	1500		収穫14日前まで	1回		1回
食用ぎく きく（葉）	白さび病	2500		収穫3日前まで	2回以内		2回以内
花き類・観葉植物	灰色かび病 黒斑病 うどんこ病	2500		発病初期	8回以内		8回以内
	ハダニ類 アザミウマ類			発生初期			
きく	白さび病			発病初期			
ゆり	葉枯病						
グラジオラス	赤斑病 ボトリチス病						
りんどう	葉枯病	2000～2500					
	苗腐敗症 （アルタナリア菌）	2500		本葉展開直後～定植前			
カーネーション	斑点病	2500～5000		発病初期			
トルコギキョウ		2500					
ホワイトレースフラワー	黄斑病						
たばこ	赤星病 うどんこ病 菌核病	2500～5000	100～180	収穫5日前まで	2回以内		2回以内
	灰色かび病	2500					