

モレスタン水和剤

作物名	適用病害虫名	希釈倍数 (倍)	使用液量 (L/10a)	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	キノキサリン系を 含む農薬の 総使用回数	
かんきつ (みかんを除く)	ハダニ類 チャノホコリダニ ミカンサビダニ	1000~2000	200~700	収穫30日前まで	1回	散布	1回	
みかん				収穫7日前まで	3回以内		3回以内	
きゅうり	うどんこ病	2000~4000	100~300	収穫前日まで	3回以内		3回以内	
	コナジラミ類	2000			5回以内		5回以内	
トマト	コナジラミ類 トマトサビダニ	1500~2000		収穫3日前まで	10回以内		10回以内	
すいか	うどんこ病	2000~4000		収穫前日まで	3回以内		3回以内	
メロン まくわうり								
かぼちゃ								
ピーマン	うどんこ病 チャノホコリダニ	2000~3000		収穫10日前まで	4回以内		4回以内	
なす	うどんこ病 チャノホコリダニ			2000				3回以内
しそ	ハダニ類 シソサビダニ	3000		収穫前日まで	3回以内	3回以内		
にがうり	うどんこ病	2000		収穫前日まで	2回以内	2回以内		
オクラ	ハダニ類 うどんこ病	3000	100~300	収穫前日まで	3回以内	散布、 但し花穂の発生期には マルチフィルム被覆により 散布液が直接花穂に飛散 しない状態で使用する		
いちご	うどんこ病	3000~4000						
みょうが (花穂)	ハダニ類	3000					みょうが(花穂)の 収穫前日まで 但し、花穂を 収穫しない場合にあつては 開花期終了まで	3回以内
みょうが (茎葉)			収穫前日まで					
はすいも(葉柄)			収穫21日前まで					
食用さくら(葉)			うどんこ病	100~700				
桑	ハダニ類	1000~2000	200~700	発生初期	10回以内	散布		
	裏うどんこ病	2000		発生初期				
花き類・観葉植物 (カーネーションを除く)	うどんこ病	2000~3000	100~300	発生初期			10回以内	
カーネーション	ハダニ類	1000		発生初期				
樹木類 (こでまり、ポインセチア、 やなぎを除く)	うどんこ病	2000	100~700	発生初期			10回以内	
こでまり		2000~3000		発生初期				
ポインセチア		コナジラミ類		1000~2000				発生初期
		うどんこ病		2000				発生初期
やなぎ	ハダニ類	1000	発生初期					
	うどんこ病	2000	発生初期					