

ラリー水和剤

作物名	適用病害名	希釈倍数 (倍)	散布液量 (L/10a)	使用時期	使用回数 *	使用方法
りんご	斑点落葉病	3000	200～700	収穫7日前まで	3回以内	散布
	うどんこ病	2000～3000				
	黒星病 赤星病			収穫14日前まで		
なし	うどんこ病	2000		収穫7日前まで	5回以内	
かき				収穫前日まで	4回以内	
もも				収穫3日前まで	3回以内	
おうとう				収穫前日まで	4回以内	
いちじく	さび病					
なす	すすかび病 うどんこ病	4000～6000	150～300	収穫前日まで	4回以内	
ピーマン とうがらし類	うどんこ病 斑点病					
きゅうり すいか	うどんこ病	4000～8000		5回以内		
メロン		6000～8000				
かぼちゃ いちご さやえんどう 実えんどう		4000～8000			3回以内	
未成熟ささげ						
アスパラガス	斑点病 茎枯病 褐斑病	4000		2回以内		
ねぎ らっきょう わけぎ	さび病	2000		収穫7日前まで	3回以内	
あさつき			収穫14日前まで			
トマト ミニトマト	葉かび病	1000	収穫前日まで			
ぎぼうし	さび病	2000	根株養成期 但し、 収穫90日前まで	2回以内		
茶	網もち病	1000	200～400		摘採14日前まで	
	炭疽病 もち病	1000～2000				
たばこ	うどんこ病	6000	100～180	収穫10日前まで		
葉ごぼう		4000	150～300	収穫21日前まで		
日本芝	カーブラリア葉枯病	1500	0.25L/m ²	発病初期	5回以内	
	さび病 カーブラリア葉枯病	1500～2000	1L/m ²			
西洋芝(バーミューダグラス)	ヘルミントスポリウム葉枯病					750～2000
西洋芝(ブルーグラス)	ダラースポット病	750～1500				
西洋芝(ベントグラス)	ヘルミントスポリウム葉枯病 ダラースポット病					
	炭疽病					
ダラースポット病						