ロブラール水利	印剤						
作物名	適用病害名	希釈倍数 (倍)	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	イプロジオンを含む農 薬の総使用回数
なし もも	黒斑病			収穫14日前まで	5回以内		5回以内
ネクタリン	ホモプシス腐敗病	1000		収穫前日まで			
おうとう  すもも	灰星病	1000		F(121)7-13-13	3 回以内		3 回以内
あんず	<u>次至</u> 祸	1000		収穫3日前まで			
びわうめ	灰色かび病	_		収穫前日まで 収穫45日前まで			
食用桑(果実)	環紋葉枯病 菌核病	1000		収穫14日前まで	2 回以内		2 回以内
キウイフルーツ	果実軟腐症 貯蔵病害	1000~1500 1500~2000		収穫前日まで	4 回以内		4 回以内
( ) ( )	(灰色かび病) 	1000 2000		開花期~落花期	. 1277		
ぶどう		1000~1500		開花期〜幼果期 但し収穫60日前まで			
マンゴー	黒とう病 灰色かび病	1000		収穫7日前まで	3 回以内		3 回以内
はとむぎ	葉枯病		60~150L/10a	収穫21日前まで		無人航空	
	灰色かび病	8	3.2L/10a			機による散布	
いちご	灰色がひ病 黒斑病 菌核病	1500					
ピーマン	灰色かび病菌核病	1000~1500 1000			4 回以内		5回以内 (種子粉衣は 1回以内、 は種後は4回以内)
きゅうり	灰色かび病	1000~1500					
21997	菌核病 つる枯病 	1000		   収穫前日まで			
ミニトマト	灰色かび病 無紋病 斑点病	1000~1500		状性 日み こ	3 回以内		4回以内 (種子粉衣は 1回以内、 は種後は 3回以内)
	双点柄 	1000~1500					
なす	黒石病 				4 回以内		5回以内 (種子粉衣は 1回以内、
すいか	褐色斑点病		400 0001				は種後は4回以内)
メロン	菌核病 つる枯病		100~300L /10a			散布	2回以内
漬物用メロン	J	1000		収穫14日前まで	1回		(種子粉衣は1回以内、 は種後は1回以内)
キャベツ	株腐病			収穫7日前まで	4 回以内		5回以内 (種子粉衣は1回以内、
	菌核病	-					は種後は4回以内) 
はくさい	白斑病 且斑病 黒斑病	1000~1500					
レタス	灰色かび病			収穫14日前まで	3 回以内		4回以内 (種子粉衣は1回以内 、 は種後は3回以内)
	菌核病 すそ枯病 	1000					
しそ	菌核病	2000		根株養成期地上部	• Elvit	_	
みつば (軟化栽培)	菌核病			切り取り前 但し、 収穫35日前まで	2回以内		4回以内 (種子粉衣は1回以内、 散布は2回以内、
		1000	2L/1 m <sup>2</sup>	伏込時 但し、 収穫30日前まで	1回	土壌灌注	土壌灌注は1回以内)
たまねぎ	灰色かび病 灰色腐敗病 黒斑病			収穫7日前まで			
	 黒斑病		100~300L /10a			散布	4回以内
ねぎ	ボトリチス葉枯症	1000~1500					(種子粉衣は1回以内, は種後は3回以内)
1&C	小菌核腐敗病	500	0.5 <b>~</b> 1L/m <sup>2</sup>			株元灌注	
	白絹病	500~1000	1L/m <sup>2</sup>	収穫14日前まで	3回以内		
わけぎ	ボトリチス葉枯症 黒斑病	1000~1500					3回以内
あさつき	小菌核腐敗病						4回以内
オクラ	黒斑病 灰色かび病	2000	100~300L /10a	収穫前日まで		散布	(種子粉衣は1回以内, は種後は3回以内)
薬用にんじん	灰色かび病						
にんじん	斑点病	1000~1500		収穫14日前まで	4 回以内		5回以内 (種子粉衣は1回以内, は種後は4回以内)
1270070	黒葉枯病	▲ 種子重量の 0.5%	_	播種前	1回	種子粉衣	
らっきょう	灰色かび病		100~300L	収穫30日前まで	3 回以内	#6-4-	3 回以内
	菌核病 夏疫病 ——————————————————————————————————	1000	/10a	収穫前日まで	4 回以内	散布	4 回以内
ばれいしょ	黒あざ病	125	3L/種いも100kg	植付前	1回	種いも散布	(種いも散布は 1回以内)
実えんどう	灰色かび病	1000		収穫前日まで			
さやえんどう 未成熟そらまめ	赤色斑点病	1500		収穫前日まで			
えだまめ だいず	灰色かび病 菌核病	1000	100~300L /10a	収穫30日前まで			4回以内
あずき	灰色かび病	1000~1500		収穫21日前まで	3 回以内	散布	(種子粉衣は1回以内、 は種後は3回以内)
いんげんまめ らっかせい	菌核病 灰色かび病	500~1000 1000~1500					
てんさい	葉腐病	500~1000	100~300 ./10a	収穫21日前まで			
		1000	_	定植時	1回	定植時に	5回以内
畑わさび	墨入病	500	3L/m <sup>2</sup>	定植後但し、		20時間 苗浸漬し、 更に定植後	5回以内 (種子粉衣は1回以内、 苗浸漬は1回以内、 定植後は3回以内)
		300	o∟/ III	収穫30日前まで		潅注する	∠に区160円以内/
あしたば	葉枯病		100 <b>~</b> 300 ./10a	収穫7日前まで	3回以内	י יע	4回以内 (種子粉衣は1回以内、 は種後は3回以内)
	黒斑病	1000	./ IUa	根株養成期(但し、		散布	
うど	菌核病	1	6L/m²	収穫50日前まで) 伏せ込み時(但し、	1回	土壌灌注	4回以内 (散布は3回以内、 土壌灌注は1回以内)
食用ゆり	葉枯病	<u> </u>	,	収穫21日前まで) 収穫7日前まで	3回以内	- 50/庄/上	3回以内
葉たまねぎ	灰色かび病、 灰色腐敗病 黒斑病	1000		収穫14日前まで	2년까수		3回以内
ひろしまな	白斑病 灰色かび病	1500		収穫前日まで	2回以内		(種子粉衣は1回以内、 は種後は2回以内)
	- ··· <del>-</del>		4				

くきちしゃ

葉ごぼう

ごぼう

のざわな

みぶな

バジル

アスパラガス

ししとう

とうがらし類

(ししとうを除く)

ズッキーニ

茶

たばこ

芝

日本芝

西洋芝

(ベントグラス)

スターチス

りんどう

野菜類・花き類

灰色かび病

菌核病

すそ枯病

菌核病

葉枯病

斑点病 褐斑病

灰色かび病

菌核病

葉腐病 (ブラウンパッチ)

ヘルミントスポリウム葉枯病

葉腐病(ラージパッチ)

ダラースポット病

灰色かび病

苗腐敗症

(アルタナリア菌)

アルタナリア菌

による病害

1000~1500

1000

2000

2000

1000~1500

1500~2000

1000~1500

250~500

1000

種子重量の

0.5%

100~300 ./10a

200~400L

/10a

200ml

/1株当り

1L/1**m**ੈ

100~300L

/10a

100~300L

/10a

収穫7日前まで

収穫30日前まで

収穫3日前まで

収穫35日前まで

収穫45日前まで

収穫14日前まで

収穫前日まで

収穫3日前まで

収穫前日まで

摘採21日前まで

大土寄時

発病初期

は種前

本葉展開直後

~定植前

は種前

3回以内

2回以内

3回以内

2回以内

3回以内

5回以内

2回以内

4回以内

2回以内

1回

8回以内

1回

2回以内

1回

株元灌注

散布

48時間

種子浸漬

散布

種子処理

機による種

子粉衣

散布

4回以内

(種子粉衣は1回以内、

は種後は3回以内)

3回以内

(種子粉衣は1回以内, は種後は2回以内)

4回以内

は種後は3回以内)

3回以内

(種子粉衣は1回以内、

は種後は2回以内)

4回以内 (種子粉衣は1回以内、

は種後は3回以内)

6回以内

(種子粉衣は1回以内、

は種後は

5回以内

3回以内 (種子粉衣は1回以内、

は種後は

2回以内)

5回以内

(種子粉衣は1回以内、

は種後は4回以内)

2回以内

1回

8回以内

8回以内

(種子粉衣は

1回以内)

2回以内

(種子浸漬は1回以内)

1回

(種子粉衣は1回以内、