

作物名	適用病害名	希釈倍数 (倍)	10a当り 散布液量 (L)	使用 時期	本剤の 使用回数	使用 方法	ピラクロストロ ピンを含む農薬 の総使用回数	ボスカリドを 含む農薬の 総使用回数						
りんご	斑点落葉病 黒星病、褐斑病 炭疽病、輪紋病 すす斑病 すす点病 黒点病、うどんこ病 腐らん病	2000	200～700	収穫前日 まで	3回以内	散布	3回以内	3回以内						
おうとう	灰星病 炭疽病 黒斑病 褐色せん孔病 幼果菌核病													
なし	黒斑病 黒星病 輪紋病 うどんこ病 炭疽病													
かき	落葉病 炭疽病 うどんこ病	2000 ～3000		2000	収穫7日 前まで		2回以内	散布	2回以内	2回以内				
	灰色かび病	2000												
もも	灰星病 ホモプシス腐敗病 黒星病 果実赤点病 すすかび病 うどんこ病 炭疽病	2000		200～700			収穫14日 前まで		3回以内	散布	3回以内	3回以内		
ネクタリン	灰星病 ホモプシス腐敗病 黒星病 うどんこ病 炭疽病													
大粒種 ぶどう	晩腐病	2000 ～2500					200～700		収穫7日 前まで		2回以内	散布	2回以内	2回以内
かんきつ	灰色かび病 そうか病 黒点病													
	炭疽病(さび果) 小黒点病	2000							収穫前日 まで		2回以内		2回以内	2回以内
小粒核果類 (うめ、すもも を除く)	黒星病 灰星病													
うめ	黒星病 環紋葉枯病 すす斑病 灰色かび病 灰星病 うどんこ病	2000	200～700			収穫前日 まで			2回以内		散布		2回以内	2回以内
すもも	黒星病 灰星病 ふくろみ病													
キウイフルーツ	灰色かび病 すす斑病 果実軟腐病	2000			200～700	摘採7日前 まで		3回以内	散布				3回以内	3回以内
茶	炭疽病 輪斑病 新梢枯死症 もち病 網もち病 褐色円星病 黒葉腐病 赤葉枯病													
ホップ	べと病 うどんこ病	2000		200～700		収穫14日 前まで		3回以内		散布			3回以内	3回以内