

ベフトップジンフロアブル

作物名	適用病害虫名	希釈倍数(倍)	使用液量(L/10a)	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	イミノクタジンを含む農薬の総使用回数	チオファネートメチルを含む農薬の総使用回数			
麦類(小麦を除く)	赤かび病	1000	60~180	収穫14日前まで	2回以内 (出穂期以降は1回以内)	散布	3回以内 (種子への処理は1回以内、散布は2回以内、 出穂期以降は1回以内)	3回以内 (種子への処理は1回以内、 出穂期以降は1回以内)			
小麦		800~1000			60~180				3回以内 (出穂期以降は1回以内)	無人航空機による散布	4回以内 (種子への処理は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内、 出穂期以降は1回以内)
		250	25								
	うどんこ病 葉枯症 赤さび病	800~1000	750~1000	根雪前							
	紅色雪腐病	750~1000			根雪前						
	雪腐大粒菌核病		8	0.8		収穫14日前まで					
赤かび病	8	0.8	収穫14日前まで	無人航空機による散布							
みかん	貯蔵病害 (青かび病 緑かび病 軸腐病 こうじかび病 黒腐病 炭疽病 白かび病 すす斑病 黒斑病)	1500	200~700	収穫7日前まで	3回以内	散布	3回以内	8回以内 (塗布は3回以内、 散布、空中散布 及び無人航空機による 散布は 合計5回以内)			
		25	8						無人航空機による散布		
		かんきつ (みかんを除く)	1500	200~700	収穫前日まで	2回以内				散布	2回以内