

オラクル顆粒水和剤

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アミスルプロムを含む農薬の総使用回数	
稲 (箱育苗)	苗立枯病 (ピシウム菌)	2000～4000倍	育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り希釈液500ml	は種時	1回	土壌灌注	1回	
		4000倍	育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り希釈液1L					
ぶどう	べと病	5000～10000倍	200～700/10a	収穫14日前まで	3回以内	散布	3回以内	
てんさい	黒根病	2000倍	200～300/10a	収穫30日前まで		1回	株元散布	5回以内(種子への処理は1回以内、苗床灌注は1回以内、株元散布は3回以内)
		100～200倍	ペーパーポット1冊当り1L(3L/m ²)	移植前	苗床土壌灌注			
キャベツ	根こぶ病	200～500倍	セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(30×60cm、使用土壌約3～4L)当り500ml	定植前	1回	灌注	8回以内(苗床での土壌混和は2回以内、灌注は1回以内、本圃での土壌混和は2回以内、散布は4回以内)	
はくさい ブロッコリー カリフラワー							7回以内(土壌混和は2回以内、灌注は1回以内、散布は4回以内)	
非結球あぶらな 科葉菜類							6回以内(土壌混和は2回以内、灌注は1回以内、散布は3回以内)	
茎ブロッコリー							3回以内(土壌混和は2回以内、灌注は1回以内)	
みょうが (花穂)	根茎腐敗病	2000倍	3L/m ²	生育期 但し、 収穫3日前まで	3回以内	土壌灌注	3回以内	
みょうが (茎葉)				みょうが(花穂)の収穫3日前まで 但し、 花穂を収穫しない場合にあっては開花期終了まで				
しょうが				1～3L/m ²				生育期 但し、 収穫3日前まで
葉しょうが				3000倍 3L/m ²				
いちご	疫病	2000～3000倍	50ml/株	育苗期	2回以内	株元灌注 土壌表面散布	2回以内	
花き類・観葉植物(ポット・プランタン等の容器栽培)		2000倍	ポット使用土壌約1L当り100mL	鉢上げ時 又は鉢替え時又は生育期				
たばこ			100～200ml/株	収穫10日前まで				
			200～400L/10a					