

ザンプロ DM フロアブル

作物名	適用病害名	希釈倍数 (倍)	使用液量 (L/10a)	使用時期	本剤の 使用回数	使用 方法	アメクトラジ ンを含む農 薬の 総使用回数	ジメトモル フを含む農薬 の 総使用回数
小粒種ぶどう	べと病	2000～3000	200～700	収穫45日前 まで	2回以内	散布		2回以内
大粒種ぶどう				収穫30日前 まで				
だいず	べと病	1500～2000	100～300	収穫7日前 まで	3回以内	無人航空機 による散布	3回以内	3回以内
		8～16	0.8～1.6			散布		
	1000～1500	100～300	無人航空機 による散布					
	8～12	0.8～1.2	散布					
あずき	茎疫病	1000	100～300	収穫前日 まで	3回以内	散布	3回以内	3回以内
		8	0.8			無人航空機 による散布		
		16	1.6			散布		
ばれいしょ	疫病	1000～1500	100～300	収穫前日 まで	3回以内	散布	3回以内	3回以内
		250	25					
		8	0.8			無人航空機 による散布		
		16	1.6			散布		
		32	3.2			無人航空機 による散布		
トマト ミニトマト		1500				散布		
きゅうり	べと病	1500～2000	100～300	収穫7日前 まで	3回以内	散布	3回以内	3回以内
たまねぎ	白色疫病 べと病					8		
ねぎ	べと病	1500～2000	100～300	収穫14日前 まで	3回以内	散布	3回以内	3回以内
		8	0.8L			無人航空機 による散布		
		16～24	1.6L			散布		
レタス はくさい	べと病	1000～2000	100～300	収穫3日前 まで	2回以内	散布	2回以内	2回以内
キャベツ		1500～2000		収穫前日 まで				
非結球レタス		1500		収穫3日前 まで				
たばこ	疫病	1000～1500	100～180	収穫10日前 まで	2回以内		2回以内	2回以内