エトフィンフロアブル

<table>
<tr><th>作物名</th><th>適用病害虫名</th><th>希釈倍数
（倍）</th><th>使用液量
（L/10a）</th><th>使用時期</th><th>本剤の使用
回数</th><th>使用方法</th><th>エタボキサムを含む
農薬の総使用回数</th></tr>
<tr><td>ぶどう</td><td>べと病</td><td>1000</td><td>200～700</td><td rowspan="4">収穫7日前まで</td><td rowspan="2">4回以内</td><td rowspan="7">散布</td><td rowspan="2">4回以内</td></tr>
<tr><td>ばれいしょ</td><td>疫病</td><td>500～750</td><td rowspan="6">100～300</td></tr>
<tr><td>はくさい</td><td rowspan="3">べと病</td><td rowspan="3">1000</td><td rowspan="3">3回以内</td><td>4回以内
（全面土壌混和は1回以内、
散布は3回以内）</td></tr>
<tr><td>キャベツ
ブロッコリー
レタス
非結球レタス</td><td rowspan="3">収穫前日まで</td><td>3回以内</td></tr>
<tr><td>トマト</td><td>疫病</td><td>1000</td><td rowspan="2">4回以内</td><td rowspan="2">4回以内</td></tr>
<tr><td>きゅうり</td><td>べと病</td><td>1000</td></tr>
</table>