ナティーボフロアブル

<table>
<tr><th>作物名</th><th>適用病害名</th><th>希釈倍数
（倍）</th><th>使用液量
（L/10a）</th><th>使用時期</th><th>使用
方法</th><th>本剤の
使用回数</th><th>テブコナゾールを含む農薬の総使用回数</th><th>トリフロキシストロビンを含む農薬の総使用回数</th></tr>
<tr><td rowspan="2">小麦</td><td>雪腐小粒菌核病</td><td rowspan="2">1000</td><td rowspan="2">60～150</td><td>根雪前</td><td rowspan="4">散布</td><td>1回</td><td rowspan="2">3回以内
（根雪前は1回以内、融雪後は2回以内）</td><td rowspan="2">3回以内
（根雪前は1回以内、融雪後は2回以内）</td></tr>
<tr><td>赤かび病</td><td>収穫21日前まで</td><td>2回以内</td></tr>
<tr><td rowspan="9">かんきつ</td><td>黒点病</td><td>1500～2000</td><td rowspan="3">200～700</td><td rowspan="15">収穫前日まで</td><td rowspan="8">3回以内</td><td rowspan="14">3回以内</td><td rowspan="8">3回以内</td></tr>
<tr><td>貯蔵病害（緑かび病）
貯蔵病害（青かび病）
炭疽病（さび果）
汚れ果症</td><td>1500</td></tr>
<tr><td>そうか病
灰色かび病</td><td>1500～2000</td></tr>
<tr><td rowspan="6">黒点病
貯蔵病害（緑かび病）
貯蔵病害（青かび病）
炭疽病（さび果）
そうか病
灰色かび病
汚れ果症</td><td>24</td><td>4～10</td><td rowspan="6">無人航空機による散布</td></tr>
<tr><td>32</td><td>6～14</td></tr>
<tr><td>36</td><td>10～16</td></tr>
<tr><td>50</td><td>7.5～22</td></tr>
<tr><td>100</td><td>15～44</td></tr>
<tr><td>200</td><td>30～88</td></tr>
<tr><td>もも</td><td>灰星病
炭疽病
うどんこ病
黒星病
ホモプシス腐敗病</td><td rowspan="3">2000</td><td rowspan="3">200～700</td><td rowspan="3">散布</td></tr>
<tr><td>かき</td><td>灰色かび病
落葉病
炭疽病
うどんこ病</td></tr>
<tr><td>うめ</td><td>黒星病
すす斑病
灰色かび病</td><td>2回以内</td><td>2回以内</td></tr>
</table>