ピシロックフロアブル

作物名	適用病害名	希釈倍数（倍）	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ピカルブトラゾクスを含む農薬の総使用回数
トマト ミニトマト ピーマン	疫病	1000	100～300L/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内
なす	褐色腐敗病						2回以内
だいこん	白さび病 ワッカ症				2回以内		
さといも	疫病				3回以内		3回以内
鱗茎類	べと病						
うり類	べと病 褐色腐敗病（すいか）						
かぶ	白さび病 べと病				2回以内		2回以内
はなやさい類	べと病						
ほうれんそう							3回以内
レタス 非結球レタス					3回以内		
非結球あぶらな科 葉菜類	白さび病						
キャベツ	べと病 ピシウム腐敗病						
はくさい	べと病 白さび病 ピシウム腐敗病						
みつば	べと病			収穫前日まで但し、伏せ込み栽培は伏せ込み前まで	2回以内		2回以内
アスパラガス	疫病	500	3L/㎡	収穫前日まで	3回以内	灌注	3回以内
みかん	褐色腐敗病	1000	200～700 L/10a			散布	
いちご	疫病	500	50～100 mL/株	開花前まで	2回以内	灌注	2回以内
てんさい	苗立枯病（アファノミセス菌） 苗立枯病（ピシウム菌）	500～1000	ペーパーポット1冊あたり1L(3L/㎡)	は種時～定植前		土壌灌注	