

タチガレエース M 粉剤

| 作物名 | 適用病害名 | 使用量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | ヒドロキシイソゾールを含む農薬の総使用回数 | メタラキシルおよびメタラキシルMを含む農薬の総使用回数 |
|-------------|--|---|------|---------|----------------------------|---|---|
| 稲 (箱育苗) | 苗立枯病 (ピシウム菌) 苗立枯病 (フザリウム菌) ムレ苗防止 根の生育促進 | 育苗箱 (30×60×3cm、 使用土壌約 5L) 1箱当り6～8g | は種前 | 1回 | 育苗箱土壌に 均一に混和 | 3回以内 (移植前の土壌混和は1回以内、 移植前の土壌灌注及び灌注は2回以内) | 4回以内 (移植前の土壌混和は1回以内、 育苗箱への灌注は1回以内、 本田では2回以内) |
| 稲 (湛水直播) | 根の生育促進による 苗立の安定 | 乾糶重量の3% | | | 過酸化カルシウ 剤に添加して種 糶に粉衣 | 1回 | 3回以内 (種もみへの処理は1回以内、 本田では2回以内) |
| さとうきび | 根腐病 | 5kg/10a | 植付時 | | 植溝土壌混和 | 1回 | |