

ベジセイバー

| 作物名    | 適用病害名   | 希釈倍数         | 散布液量             | 使用時期         | 本剤の使用回数 | 使用方法       | ペンチオピラドを含む農薬の総使用回数                                 | TPNを含む農薬の総使用回数   |
|--------|---|--------------|------------------|--------------|---------|------------|--|--|
| キャベツ   | べと病<br>株腐病<br>菌核病                                       | 1000倍        | 100～<br>300L/10a | 収穫14日<br>前まで | 2回以内    | 散布         | 3回以内   | 3回以内(は種又は定植前の土壌混和は1回以内、散布、無人航空機散布及びエアゾル剤の噴射は合計2回以内)                |
|        |   | 16倍          | 1.6L/10a         |              |         | 無人航空機による散布 |  |  |
| はくさい   | 黒斑病<br>白斑病<br>白さび病<br>べと病<br>菌核病                        | 1000倍        | 100～<br>300L/10a | 収穫7日<br>前まで  | 3回以内    | 散布         | 3回以内   | 3回以内(は種又は定植前の土壌混和は1回以内、散布は2回以内)                                    |
| ブロッコリー | 菌核病<br>べと病黒<br>黒すす病                                     |              |                  | 16倍          |         | 1.6L/10a   |  | 出蕾前但し、<br>収穫21日<br>前まで   |
| すいか    | うどんこ病<br>つる枯病<br>炭疽病<br>菌核病                             | 1000倍        | 100～<br>300L/10a | 収穫3日<br>前まで  | 3回以内    | 散布         | 3回以内   | 5回以内   |
| メロン    | べと病<br>うどんこ病<br>つる枯病                                    |              |                  | 収穫前日<br>まで   |         |            |  |  |
| きゅうり   | べと病<br>うどんこ病<br>灰色かび病<br>褐斑病<br>炭疽病<br>黒星病              | 16倍          | 1.6L/10a         | 収穫7日前ま<br>で  | 3回以内    | 無人航空機による散布 | 3回以内   | 14回以内<br>(土壌灌注は2回以<br>内、散布、常温煙<br>霧、くん煙及びエア<br>ゾル剤の噴射は合計<br>12回以内) |
| かぼちゃ   | うどんこ病<br>つる枯病<br>べと病<br>白斑病                             |              |                  | 散布           |         | 3回以内       |  |  |
| にがうり   | うどんこ病   | 1000倍        | 100～<br>300L/10a | 収穫前日<br>まで   | 2回以内    | 散布         | 3回以内   | 6回以内(土壌灌注<br>は2回以内、散布、<br>常温煙霧、くん煙及<br>びエアゾル剤の噴射<br>は合計4回以内)       |
| トマト    | 疫病<br>うどんこ病<br>灰色かび病<br>葉かび病<br>すすかび病                   |              |                  |              |         |            |  |  |
| ミニトマト  | 疫病<br>うどんこ病<br>灰色かび病<br>葉かび病<br>すすかび病<br>斑点病            | 1000倍        | 100～<br>300L/10a | 収穫前日<br>まで   | 3回以内    | 散布         | 3回以内   | 4回以内   |
| なす     | うどんこ病<br>灰色かび病<br>すすかび病<br>菌核病<br>黒枯病<br>褐色斑点病<br>褐色円星病 |              |                  |              |         |            |  |  |
| ピーマン   | うどんこ病<br>灰色かび病<br>炭疽病<br>黒枯病<br>斑点病                     | 16倍          | 1.6L/10a         | 収穫7日前ま<br>で  | 4回以内    | 無人航空機による散布 | 4回以内   | 6回以内   |
| たまねぎ   | べと病<br>灰色かび病<br>灰色腐敗病<br>小菌核病                           |              |                  |              |         |            |  |  |
| ねぎ     | べと病<br>さび病<br>白絹病<br>葉枯病<br>黒斑病<br>小菌核腐敗病               | 1000倍        | 100～<br>300L/10a | 収穫14日前<br>まで | 2回以内    | 散布         | 4回以内(株元灌<br>注は2回以内、<br>散布及び無人航<br>空機散布は合計<br>2回以内) | 4回以内(土壌灌注は<br>1回以内、散布及び<br>無人航空機散布は<br>合計3回以内)                     |
|        |   | 16倍          | 1.6L/10a         |              |         | 無人航空機による散布 |  |  |
| にんにく   | さび病   | 1000倍        | 100～<br>300L/10a | 収穫7日前ま<br>で  | 3回以内    | 散布         | 4回以内(種球塗<br>沫は1回以内、散<br>布は3回以内)                    | 6回以内   |
| レタス    | べと病<br>菌核病<br>すそ枯病<br>灰色かび病                             | 収穫14日前<br>まで |                  | 3回以内         | 3回以内    |            | 5回以内(土壌灌注<br>は2回以内、散布は<br>3回以内)                    |  |
| リーフレタス | 同上  | 1000倍        | 100～<br>300L/10a | 収穫21日前<br>まで | 2回以内    | 散布         | 4回以内   | 2回以内   |
| アスパラガス | 茎枯病<br>斑点病<br>褐斑病                                       |              |                  | 収穫前日<br>まで   | 4回以内    |            |  | 4回以内   |
| きく     | 白さび病  | 1000倍        | 100～<br>300L/10a | 発病前～発<br>病初期 | 3回以内    | 散布         | 3回以内   | 6回以内   |
| 同上     | 同上  |              |                  | 同上           | 同上      |            |  |  |