作物名	適用病害名	使用量 (kg/10a)	使用時期	本剤の 使用回数	シメコナゾールを 含む農薬の総使 用回数	使用 方法
稲	紋は 対は 対は がは がは がは がは がは がは がは がは がは が	3~4	収穫30 日前 まで	2回以内	2回以内 (移植時ま での処理は 1回以内)	湛水散布
	穂枯れ (ごま葉枯病菌) 穂枯れ (すじ葉枯病菌)	4				
こんにゃく	白絹病	4~6	培土時 但し、収穫 120日 前まで	3回以内	3回以内	株元散布 (散布後 土寄せ)
キャベツ	株腐病	6	定植前	1回 1回 6回以内		全面土壌 混和
ごぼう	黒あざ病	9~18	は種時		1回	播溝土壌 混和
非結球レタス	すそ枯病	9~12	定植前			全面土壌
レタス	ビッグベイン病	12				
にんにく	黒腐菌核病	18	植付前		6回以内 (植付前は 1回以内、 植付散の 株元散内は 2回以内、 散布は 3回以内)	
	白絹病	6	土寄せ時 但し、収穫 75日 前まで (茎葉展開期)	2回以内		株元散布
ねぎ	黒腐菌核病	6	生育期	3回以内	3回以内 (は種時は 1回以内)	株元散布
	小菌核腐敗病		但し、収穫 14日 前まで			
	白絹病 小菌核病	4~6	土寄せ時但し、 収穫 14日前まで			
	黒穂病		は種時			土壌表面
にら	白絹病	6	定植前		Ī	放布 作条土壌
ほうれんそう	苗立枯病 (リゾクトニア菌)	4~6	は種時	1回	1回	播溝土壌 昆和
未成熟とうもろこし	紋枯病	6	収穫7日前まで	2回以内	2回以内	株元散布
とりかぶと(薬用)	白絹病	9	培土時	3回以内	3回以内	株元散布 (散布後土寄 せ)