

ソイリン

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量	本剤の使用回数	使用方法	クロルピクリンを含む農薬の総使用回数	D-Dを含む農薬の総使用回数
<p>にんじん、だいこん、はくさい、かぼちゃ、ばれいしょ、かんしょ、さといも、やまのいも、こんにゃく、オクラ、豆類（未成熟、ただし、さやいんげん、未成熟そらまめ、さやえんどう、実えんどうを除く）</p>	<p>1年生雑草</p>	<p>作付の10～15日前まで</p>	<p>20～30L / 10a(1穴当たり2～3ml)</p>	<p>1回</p>	<p>耕起整地後、30cm間隔のチドリ状に深さ15cmに所定量を注入し、直ちに覆土し、ポリエチレン、ビニール等で被覆する。</p>	<p>1回</p>	<p>1回</p>
<p>ごぼう、なす、ほうれんそう、しょうが、みょうが(花穂)、みょうが(茎葉)、にがうり、葉しょうが、さやえんどう、実えんどう</p>						<p>2回以内(床土は1回以内)</p>	
<p>すいか、トマト、ミニトマト、きゅうり、ピーマン、とうがらし類、いちご、ねぎ、セルリー、さやいんげん、花き類・観葉植物</p>						<p>3回以内(床土1回以内、圃場2回以内)</p>	
<p>メロン、キャベツ、未成熟そらまめ</p>						<p>2回以内(床土1回以内、圃場1回以内)</p>	