

ニイロン								
作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	クロルピクリンを含む農薬の総使用回数	D-Dを含む農薬の総使用回数	
にんじん	しみ腐病	30L/10a(1穴 当り3ml)	作付の10 ～15日前 まで	1回	耕起整地後、30cm 間隔のチドリ状に深 さ15cmに所定量を 注入し、直ちに覆土 し、ポリエチレン、ビ ニール等で被覆す る。	1回	1回	
ごぼう	ネグサレセンチュウ ネコブセンチュウ	20～30L /10a(1穴当り 2～3ml)				2回以内(床土1 回以内)		
	黒あざ病	30L/10a(1穴 当り3ml)				3回以内 (床土1回以内、 圃場2回以内)		
すいか	つる割病 黒点腐敗病							20～30L /10a(1穴当り 2～3ml)
さやいんげん	ネグサレセンチュウ ネコブセンチュウ	30L/10a(1穴 当り3ml)				2回以内 (床土1回以内、 圃場1回以内)		
メロン	黒点根腐病 えそ斑点病 つる割病							20～30L /10a(1穴当り 2～3ml)
だいこん	バーティシリウム黒点病	30L/10a(1穴 当り3ml)				1回		
はくさい	ネグサレセンチュウ ネコブセンチュウ							20～30L /10a(1穴当り 2～3ml)
	黄化病 根くびれ病	2回以内 (床土1回以内、 圃場1回以内)						
キャベツ	苗立枯病 (リゾクトニア菌)					30L/10a(1穴 当り3ml)		2回以内(床土1 回以内)
未成熟そらまめ	ネグサレセンチュウ ネコブセンチュウ							
なす	青枯病	30L/10a(1穴 当り3ml)				2回以内(床土1 回以内)		
トマト ミニトマト	萎凋病 ネグサレセンチュウ ネコブセンチュウ	20～30L /10a(1穴当り 2～3ml)				30L/10a(1穴 当り3ml)		3回以内 (床土1回以内、 圃場2回以内)
きゅうり	青枯病	20～30L /10a(1穴当り 2～3ml)						
	つる割病 ホモブシス根腐病							
ピーマン とうがらし類	ネグサレセンチュウ ネコブセンチュウ	30L/10a(1穴 当り3ml)				1回		
かぼちゃ	立枯病	20～30L /10a(1穴当り 2～3ml)						
こまつな	ネグサレセンチュウ ネコブセンチュウ					30L/10a(1穴 当り3ml)		2回以内(床土 は1回以内)
レタス かぶ 豆類(未成熟た、だし、さ やいんげん、未成熟そら まめ、さやえんどう、実え んどうを除く)	ネグサレセンチュウ ネコブセンチュウ	20～30L /10a(1穴当り 2～3ml)						1回
ほうれんそう	萎凋病 ネグサレセンチュウ ネコブセンチュウ	30L/10a(1穴 当り3ml)				2回以内(床土1 回以内)		
しょうが	ネグサレセンチュウ ネコブセンチュウ							
ばれいしょ	根茎腐敗病	20～30L /10a(1穴当り 2～3ml)				1回		
	そうか病 青枯病							
かんしょ	ネグサレセンチュウ ネコブセンチュウ	30L/10a(1穴 当り3ml)				3回以内 (床土1回以内、 圃場2回以内)		
さといも	立枯病	20～30L /10a(1穴当り 2～3ml)						
やまのいも	ネグサレセンチュウ ネコブセンチュウ					30L/10a(1穴 当り3ml)		
いちご	根腐病 褐色腐敗病	20～30L /10a(1穴当り 2～3ml)						1回
	炭疽病							
こんにゃく	ネグサレセンチュウ ネコブセンチュウ	20～ 30ml/10a(1穴 当り2～3ml)				3回以内 (床土1回以内、 圃場2回以内)		
ねぎ	根腐病	30ml/10a(1穴 当り3ml)						
	白絹病							
さやえんどう 実えんどう みょうが(花穂) みょうが(茎葉) にがうり 葉しょうが	ネグサレセンチュウ ネコブセンチュウ	30L/10a(1穴 当り3ml)				2回以内(床土1 回以内)		
オクラ	苗立枯病	20～30L /10a(1穴当り 2～3ml)						
パセリ	立枯病					30L/10a(1穴 当り3ml)		
セルリー	ネグサレセンチュウ ネコブセンチュウ	20～30L /10a(1穴当り 2～3ml)						1回
	萎黄病							
きく	半身萎凋病	30L/10a(1穴 当り3ml)						
	ネグサレセンチュウ ネコブセンチュウ							
ストック	萎凋病	20～30L /10a(1穴当り 2～3ml)				3回以内 (床土1回以内、 圃場2回以内)		
	ネグサレセンチュウ ネコブセンチュウ							
チューリップ	球根腐敗病	20～30L /10a(1穴当り 2～3ml)						
	ネグサレセンチュウ ネコブセンチュウ							
カーネーション	萎凋細菌病	30L/10a(1穴 当り3ml)				1回		
	ネグサレセンチュウ ネコブセンチュウ							
トルコギキョウ	根腐病 立枯病	30L/10a(1穴 当り3ml)				3回以内 (床土1回以内、 圃場2回以内)		
花き類・観葉植物(スト ック、チューリップ、きく、 カーネーション、トルコギ キョウを除く)	ネグサレセンチュウ ネコブセンチュウ	20～30L /10a(1穴当り 2～3ml)						
たばこ	ネコブセンチュウ 立枯病	(畦内土壌注 入)1穴当り2 ～3ml	作付の30 日前まで	(畦内土壌注入)畦 立後、畦中央の頂 上から、30cm間 隔で、35cmの深さに 所定量を注入し、直 ちに注入口をふさ ぎ、ポリエチレン、 ビニールなどで被 覆する。	1回			