

ポリオキシン Z ドライフロアブル

作物名	適用病害虫名	希釈倍数 (倍)	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	ポリオキシンを 含む農薬の総 使用回数	
日本芝	葉腐病 (ラージパッチ)	1,000	発病初期	6回以内	1m ² 当たり0.25～0.5L 散布	6回以内	
		2,000			1m ² 当たり1L散布		
	ヘルミントスポリウム葉枯 病	1,000			1m ² 当たり0.25～0.5L 散布		
		2,000			1m ² 当たり1L散布		
	カーブラリア葉枯病	1,000			1m ² 当たり0.25～0.5L 散布		
		2,000			1m ² 当たり1L散布		
	疑似葉腐病 (春はげ症)	1,000	休眠期前		1m ² 当たり0.25～0.5L 散布		
		2,000			1m ² 当たり1L散布		
	疑似葉腐病 (象の足跡)	1,000	6回以内		1m ² 当たり0.25～0.5L 散布		
		2,000			1m ² 当たり1L散布		
	フェアリーリング病	250			1m ² 当たり2L散布		
		500			1m ² 当たり0.5～1L散 布		
西洋芝 (ベントグラス)	葉腐病 (ブラウンパッチ)	1,000		発病初期	6回以内	1m ² 当たり0.25～0.5L 散布	6回以内
		2,000				1m ² 当たり1L散布	
	ヘルミントスポリウム葉枯 病	1,000	1m ² 当たり0.25～0.5L 散布				
		2,000	1m ² 当たり1L散布				
	カーブラリア葉枯病	1,000	1m ² 当たり0.25～0.5L 散布				
		2,000	1m ² 当たり1L散布				
	炭疽病	500	1m ² 当たり0.25L散布				
	フェアリーリング病	250	1m ² 当たり2L散布				
		500	1m ² 当たり0.5～1L散 布				