

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フルラニルを含む農薬の総使用回数				
稲	紋枯病	2000倍	60～150ℓ /10a	収穫14日前まで	3回以内	散布	3回以内(小包装投入は1回以内)				
キャベツ	株腐病		100～300ℓ /10a	収穫7日前まで			6回以内(種子粉衣は1回以内、定植前の土壌混和は2回以内、散布は3回以内)				
しょうが	紋枯病			100～300ℓ /10a	収穫3日前まで		5回以内	5回以内			
葉しょうが			4回以内(植付時の処理は1回以内、植付後は3回以内)								
レタス	すそ枯病	1000～2000倍	100～300ℓ /10a	収穫7日前まで	3回以内	散布	4回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は3回以内)				
	白絹病	2000倍									
リーフレタス	すそ枯病	1000～2000倍		収穫30日前まで				土寄せ時 但し、 収穫30日前まで	3回以内	株元散布	4回以内(種子粉衣は1回以内、 全面土壌散布及び株元散布は合計3回以内)
	白絹病	2000倍									
サラダ菜	すそ枯病 白絹病			収穫30日前まで							
	ねぎ										
みょうが(花穂)	紋枯病		1000～2000倍	3ℓ/㎡	収穫3日前まで	2回以内	土壌灌注				
みょうが(茎葉)		みょうが(花穂)の 収穫3日前まで但し、 花穂を収穫しない場合に あつては開花期終了まで									
きゅうり トマト	苗立枯病 (リゾクトニア菌)	1000～2000倍	100～300ℓ /10a	は種時～子葉展開時	1回	株元灌注	2回以内(種子粉衣は1回以内、 土壌灌注は1回以内)				
畑わさび	茎腐病	2000倍		収穫30日前まで	2回以内		株元散布	3回以内(種子粉衣は1回以内、 は種後は2回以内)			
にら(花茎)	白絹病			1ℓ/株					収穫前日まで	3回以内	株元灌注
ししとう		1000倍									
ばれいしょ	黒あざ病	100～200倍	—	植付前	1回	散布	1回				
		20倍	種いも 100kg 当り3ℓ								
てんさい	葉腐病	250倍	25ℓ/10a	収穫14日前まで	4回以内	灌注	5回以内(定植前の 灌注は1回以内、 散布は4回以内)				
	葉腐病 根腐病	1000倍	100～300ℓ /10a								
	根腐病	200倍	ペーパーポット 1冊当り1ℓ(3ℓ /㎡)	定植前	1回						
花き類・観葉植物	白絹病	1000～2000倍	100～300ℓ /10a	—	3回以内	株元散布	3回以内				
樹木類		くもの巣病	1000倍	3ℓ/㎡		発病初期		土壌灌注			
	200～ 700L/10a			散布							
えぞまつ(苗木) とどまつ(苗木)	苗立枯病 (リゾクトニア菌)		3ℓ/㎡	発芽後 (初病初期)				苗木兼全面 土壌散布			