

モンカットフロアブル 40

作物名	適用病害虫名	希釈倍数 (倍)	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フルトラニルを含む農薬の総使用回数				
稲	紋枯病	2000	60～150ℓ /10a	収穫14日前まで			4回以内				
キャベツ	株腐病			収穫7日前まで	4回以内		7回以内 (種子粉衣は1回以内、定植前の土壌混和は2回以内、散布は4回以内)				
しょうが	紋枯病						収穫3日前まで	4回以内	6回以内		
葉しょうが			5回以内 (植付時の処理は1回以内、植付後は4回以内)								
レタス	すそ枯病	1000～2000	100～300ℓ /10a	収穫7日前まで	3回以内		5回以内 (種子粉衣は1回以内、定植前の土壌混和は1回以内、散布は3回以内)				
	白絹病	2000									
非結球レタス	すそ枯病	1000～2000									6回以内 (種子粉衣は1回以内、定植前の土壌混和は1回以内、散布は4回以内)
	白絹病	2000									
ねぎ	白絹病				土寄せ時 但し、収穫30日前まで	4回以内	株元散布	5回以内 (種子粉衣は1回以内、全面土壌散布及び株元散布は合計4回以内)			
	オオシロカラカサタケ	収穫30日前まで									
みょうが(花穂)	紋枯病	2000	3ℓ/m ²	収穫3日前まで	3回以内	土壌灌注	3回以内				
みょうが(茎葉)				みょうが(花穂)の収穫3日前まで但し、花穂を収穫しない場合にあつては開花期終了まで							
きゅうり トマト	苗立枯病 (リゾクトニア菌)	1000～2000		は種時～子葉展開時	1回		2回以内(種子粉衣は1回以内、土壌灌注は1回以内)				
畑わさび	茎腐病	2000	100～300ℓ /10a	収穫30日前まで	2回以内	株元散布	3回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は2回以内)				
にら(花茎)	白絹病			収穫前日まで							
にら				収穫14日前まで	1回		2回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は1回以内)				
ししとう		1000	1ℓ/株	収穫前日まで	3回以内	株元灌注	4回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は3回以内)				
ばれいしょ	黒あざ病	100～200	—	植付前	1回	瞬時～10分間種いも浸漬	1回				
		20	種いも 100kg 当り3ℓ 種いも100kg 当り 200～300mℓ			散布					
てんさい	葉腐病	250	25ℓ/10a	収穫7日前まで	5回以内		7回以内 (種子粉衣は1回以内、定植前の灌注は1回以内、散布は5回以内)				
	葉腐病 根腐病	1000	100～300ℓ /10a								
	根腐病	200	ペーパーポット 1冊当り1ℓ(3ℓ /m ²)	定植前	1回	灌注					
とうもろこし	紋枯病	2000	100～300ℓ /10a	収穫3日前まで	3回以内	散布	3回以内				
花き類・観葉植物	白絹病	1000～2000		—	3回以内	株元散布	3回以内				
樹木類			くもの巣病	3ℓ/m ²		発病初期		土壌灌注			
	えぞまつ(苗木) とどまつ(苗木)	苗立枯病 (リゾクトニア菌)	1000	200～700L/10a			散布				
		3ℓ/m ²		発芽後 (初病初期)		苗木兼全面土壌散布					