アタッキン水和剤

作物名	適用病害虫名	希釈倍数（倍）	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	ストレプトマイシンを含む農薬の総使用回数	チオファネートメチルを含む農薬の総使用回数	使用方法
ばれいしょ	黒あざ病 黒あし病	40	―	植付前	1回	5回以内（種いもへの処理は1回以内	5回以内（種いもへの処理は1回以内	5～10秒間種いも浸漬
			種いも100kg当り2.5～3L					種いも散布
	そうか病	40～60	―					5～10秒間種いも浸漬
うめ	かいよう病 黒星病	800～1000	200～700L/10a	収穫90日前まで	2回以内	2回以内	6回以内（塗布は3回以内、散布は3回以内）	散布
もも	せん孔細菌病 黒星病	1000		収穫60日前まで			10回以内（塗布は3回以内、休眠期の散布は1回以内、生育期の散布は6回以内）	
キャベツ	菌核病	1500	100～300L/10a	収穫14日前まで			3回以内（種子への処理は1回以内、は種後は2回以内	
はくさい	軟腐病 白斑病	1000				3回以内		
たまねぎ	軟腐病 灰色腐敗病	800		収穫7日前まで	5回以内	5回以内	7回以内（種子への処理は1回以内、苗根部浸漬は1回以内、無人ヘリ散布は3回以内、散布は5回以内	
こんにゃく	乾腐病 腐敗病	1000	―	貯蔵前または植付前	1回	6回以内（種いもへの処理は1回以内）	1回	1時間種いも浸漬
		30	平置きした種いも1㎡当り150ml	植付前				種いも散布
チューリップ	球根腐敗病 かいよう病	球根重量の0.2～0.5%）	―	貯蔵前または植付前		1回	5回以内	球根粉衣