

トリフミンジェット

| 作物名  | 適用場所               | 適用病害虫名         | 使用量   | 使用時期   | 本剤の使用回数  | トリフルミゾールを含む農薬の総使用回数 | 使用方法 |      |
|--|--------------------|----------------|---|--------|----------|---------------------|------|------|
| きゅうり<br>すいか<br>いちご<br>ピーマン<br>メロン<br>ししとう<br>さやえんどう<br>実えんどう | 温室、ビニールハウス等密閉できる場所 | うどんこ病          | くん煙室容積<br>400m <sup>3</sup><br>(床面積200m <sup>2</sup><br>X高さ2m)<br>当り50g | 収穫前日まで | 5回以内     | 5回以内                | くん煙  |      |
| トマト<br>ミニトマト   |                    | 葉かび病           |   |        |          |                     |      |      |
| なす   |                    | うどんこ病<br>すすかび病 |   |        |          |                     |      |      |
| ズッキーニ<br>ズッキーニ(花)  |                    | うどんこ病          | くん煙室容積<br>400m <sup>3</sup> (床面積<br>200m <sup>2</sup> X高さ2<br>m)当り100g  | —      | 4回以内     | 4回以内                |      |      |
| ふき   |                    |                |   |        | 収穫14日前まで | 3回以内                |      | 3回以内 |
| ばら   |                    |                |   |        |          |                     |      |      |
| きく   |                    | 白さび病           |   |        | 5回以内     | 5回以内                |      |      |
| こんにゃく  |                    | 乾腐病            | くん煙室容積<br>2m <sup>3</sup> (床面積1m <sup>2</sup><br>X高さ2m)<br>当り50~100g    | 植付前    | 1回       | 1回                  |      |      |
| チューリップ   |                    | 球根腐敗病          | くん煙室容積<br>2m <sup>3</sup> (床面積1m <sup>2</sup><br>X高さ2m)<br>当り50g        |        |          |                     |      |      |