

マイコシールド

作物名	適用病害名	希釈倍数(倍)	使用液量 (l/10a)	使用時期	本剤の 使用回数	オキシテラ サイクリンを 含む農薬の総 使用回数	使用方法
もも	せん孔細菌病	1500~3000	200~700	収穫21日前まで	5回以内	5回以内	散布
ネクタリン		1500		収穫28日前まで			
すもも	黒斑病	2000		収穫21日前まで	3回以内	3回以内	
おうとう	樹脂細菌病	1500		収穫7日前まで	2回以内	2回以内	
うめ	かいよう病			1500~3000	収穫21日前まで	4回以内	
あんず		1000			収穫14日前まで	2回以内	
かんきつ (みかんを除く)				1000	収穫30日前まで		
みかん		収穫60日前まで					
だいこん	軟腐病	750~1000	100~300	収穫14日前まで	3回以内	3回以内	
きゅうり	斑点細菌病	1500	—	は種前	1回	1回	1~2時間種 子浸漬
トマト	かいよう病	1000~2000	100~300	収穫開始7日前まで	2回以内	2回以内	散布
ブロッコリー	花蕾腐敗病			収穫14日前まで			
キャベツ	黒腐病			収穫7日前まで			
ばれいしょ	軟腐病	1000		収穫21日前まで	5回以内	5回以内(種い もへの処理は1 回以内)	
樹木類	枝枯細菌病		200~700	新梢伸長期~発病 初期		5回以内	