

ミギワ 20 フロアブル

| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 (倍) | 使用液量 (L/10a) | 使用時期 | 本剤の 使用回数 | 使用 方法 | イプフルフェノ キンを含む農 薬の総使用 回数 |
|-------------|--------------------------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|----------|----------------------------------|
| りんご | うどんこ病 黒星病 斑点落葉病 灰色かび病 | 2000～4000 | 200～700 | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| なし | 黒星病 うどんこ病 | | | | | | |
| おうとう | 灰星病 | | | | | | |
| もも ネクタリン | 灰星病 ホモプシス腐敗病 黒星病 | | | | | | |
| 小粒核果類 | 灰色かび病 | 2000 | 200～700 | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| | 灰星病(すもも) 黒星病 | | | | | | |
| かき | うどんこ病 炭疽病 落葉病 灰色かび病 | 2000～4000 | 200～400 | 摘採7日前 まで | 2回以内 | 2回以内 | |
| ぶどう | 灰色かび病 褐斑病 | 2000 | | | | | |
| | 晩腐病 | 2000～4000 | | | | | |
| | 黒とう病 | 2000 | | | | | |
| かんきつ | 灰色かび病 | 2000～4000 | 200～400 | 摘採7日前 まで | 2回以内 | 2回以内 | |
| 茶 | 炭疽病 | | | | | | |