

ラビライト水和剤

作物名	適用病害虫名	希釈倍数 (倍)	使用液量 (L/10a)	使用時期	本剤の 使用回数	使用 方法	チオファネートメチ ルを含む農薬の 総使用回数	マンネブを含 む農薬の総 使用回数	
みかん	黒点病 小黒点病 そうか病 灰色かび病 ミカンサビダニ	500～800	200～700	収穫60日前 まで	2回以内	散布	8回以内(塗布は3 回以内、散布、空 中散布および無人 航空機散布は合計 5回以内)	2回以内	
	黄斑病 そばかす病	500							
りんご	すす点病 すす斑病 黒点病 炭疽病 うどんこ病 褐斑病 黒星病 斑点落葉病 輪紋病 腐らん病	500～600		収穫30日前 まで	1回		10回以内(塗布は 3回以内、灌注は1 回以内、散布は6 回以内)	1回	
	晩腐病	800～1000		落弁期まで ただし、収穫 75日前まで			5回以内(塗布は3 回以内、休眠期の 散布は1回以内、 生育期の散布は1 回以内)	2回以内	
かき	炭疽病 うどんこ病 落葉病	500～800		収穫45日前 まで	2回以内		10回以内(塗布は 3回以内、休眠期 の散布は1回以 内、生育期の散布 は6回以内)	2回以内	
なし	黒星病 黒斑病	500			3回以内		11回以内(塗布は 3回以内、休眠期 の散布は1回以 内、灌注は1回以 内、生育期の散布 は6回以内)	3回以内	
	輪紋病								
ばれいしょ	疫病	400～600		100～300	収穫14日前 まで		4回以内	5回以内(種いもへ の処理は1回以 内)	7回以内
やまのいも	葉渋病 炭疽病	400							
ばら	黒星病 うどんこ病	500～800			—		5回以内	8回以内	
チューリップ	褐色斑点病 灰色かび病								